

## Notiziario fitosanitario per l'area della Gallura

N. 1/2011 - Valido per il periodo:  
23 marzo - 15 aprile 2011

### Consigli colturali



#### Vite

Località: Olbia – Berchiddeddu – Arzachena  
Fase fenologica: gemma cotonosa-punte verdi

Località: Monti- Berchidda- Oschiri  
Fase fenologica: riposo vegetativo

Terminata la potatura invernale è buona norma asportare tutto il legno colpito da escoriosi o mal dell'esca. Come più volte ricordato in molti vigneti, l'escoriosi sta diventando una malattia molto diffusa. Pertanto si consiglia di effettuare un ciclo di tre trattamenti, il primo in fase riposo - gemma cotonosa -punte verdi; il secondo e il terzo a

distanza di otto giorni l'uno dall'altro.

I principi attivi consigliati sono: poltiglia bordolese dose massima prevista in etichetta per trattamenti invernali; oppure Zolfo micronizzato (dose- 600-800 gr per 100 litri d'acqua) con l'aggiunta o di mancozeb (dose: 150-200gr x 100 lt) oppure mancozeb 80% (dose: 350-400 lt x 100 lt ).

Si consiglia di fare la manutenzione delle macchine e degli ugelli allo scopo di avere l'efficacia dei trattamenti. Vista la normativa nazionale sui fitofarmaci si informano tutti gli agricoltori che è fatto obbligo in azienda la tenuta e la corretta compilazione di un registro completo dei trattamenti a cui devono essere allegate le ricevute o fatture d'acquisto.

### Previsioni del tempo

Rilevate dal sito web del Dipartimento specialistico regionale idrometeorologico dell'Arpas

#### Giovedì 24 marzo 2011

Cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: minime stazionarie, massime in leggero aumento.

Venti: deboli orientali, variabili dal pomeriggio.

Mari: poco mossi, localmente mossi.

#### Venerdì 25 marzo 2011

Cielo poco nuvoloso con passaggi di nubi medio-alte.

Temperature: minime in aumento, massime senza variazioni di rilievo.

Venti: deboli, localmente moderati, dai quadranti meridionali.

Mari: poco mossi o mossi.

#### Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di sabato e domenica saranno caratterizzate da cielo poco nuvoloso con passaggi di nubi medio-alte. Le temperature aumenteranno lievemente in entrambi i valori.

I venti soffieranno deboli di direzione variabile e i mari saranno poco mossi, localmente mossi.

## Notiziario fitosanitario per l'area della Gallura

N. 2/2011 - Valido per il periodo:  
28 aprile - 13 maggio 2011

### Consigli colturali



#### Olivo

Areale: Budoni – Olbia - Berchidda

Fase fenologica: mignolatura;

#### Fleotribo (Phloeotribus scarabeoides)

si consiglia di rimuovere con urgenza i residui della potatura avendo svolto la funzione di rami esca, per cui non provvedendovi, possono risultare essi fonte di diffusione della infestazione; per consentire di recuperare scorte come legna da ardere, è possibile accatastare il legname in luogo soleggiato, coprire con telo di plastica a tenuta stagna, così da causarne la morte dell'insetto per l'innalzamento termico.

#### Cicloconio (Spilocaea oleaginea), Cercosporiosi (Mycocentrospora cladosporioides)

Solo in caso di forte attacco e la fioritura non è in atto, chi non ha ancora provveduto ad eseguire alcun trattamento anticrittogamico, può farlo in tempi brevi utilizzando prodotti a base di ossicloruro di rame o dodina, altrimenti si rinvia il tutto a dopo l'allegagione.

#### Concimazione

Chi non l'ha ancora eseguita può distribuire l'azoto frazionato in 2 – 3 volte.

Le dosi per oliveti con produzioni medie di 40 q.li/Ha sono:

- Azoto kg. 60-80;
- Fosforo (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) Kg. 30-50;
- Potassio (K<sub>2</sub>O) Kg. 60-80;

## Notiziario fitosanitario per l'area della Gallura

N. 3/2011 - Valido per il periodo:  
05 maggio - 16 maggio 2011

### Consigli colturali



#### Vite

Località: Olbia – Berchiddeddu –  
Arzachena

Fase fenologica: grappoli separati

Località: Monti- Berchidda- Oschiri

Fase fenologica: terza foglia distesa – grappoli visibili

Dai rilievi in campo si sono notati sporadici attacchi di botrite su foglia non tali da determinare un trattamento. Le abbondanti piogge verificatesi nei giorni scorsi e lo sviluppo della coltura, possono aver determinato l'avvio delle infezioni primarie di peronospora. Si consiglia di intervenire al più presto con prodotti citotropico/endoterapico (Cimoxanil, Dimetomorf, Mandipropamide, Fluopicolide, ecc.) associati ad un prodotto di contatto (Folpet o Mancozeb).

Si precisa che il Folpet risulta molto resistente al dilavamento, e ha azione collaterale anche contro la muffa grigia ed l'escoriosi, ma non lo possono usare coloro che hanno aderito alla mis. 214 azione 6 "produzione integrata".

#### Oidio

Con il trattamento antiperonosporico è importante aggiungere anche prodotti antioidici. In particolare nei vigneti dove l'anno scorso si sono verificati attacchi si consiglia di associare Zolfo bagnabile micronizzato ; Meptildinocap; SpiroxaminaE' inoltre possibile sin da ora effettuare il diradamento dei germogli che determinano un eccessivo affastellamento eliminando preferibilmente quelli mal posizionati e privi di produzione. Si consiglia di asportare i germogli inseriti alla base del ceppo perchè difficilmente raggiungibili dal trattamento e quindi possibili inoculo dei funghi.



#### Olivo

Areale: Budoni – Olbia –  
Berchidda

Fase fenologica: mignolatura

Fleotribo (Phloeotribus scarabeoides): si consiglia di rimuovere con urgenza i residui della potatura avendo svolto la funzione di rami esca, per cui non provvedendovi, possono risultare fonte di diffusione dell'infestazione; per consentire di recuperare scorte come legna da ardere, è possibile accatastare il legname in luogo soleggiato, coprire con telo di plastica a tenuta stagna, così da causare la morte dell'insetto per l'innalzamento termico;

Cicloconio (Spilocaea oleaginea), Cercosporiosi (Mycocentrospora cladosporioides): solo in caso di forte attacco e a fioritura non in atto, chi non avesse ancora provveduto ad eseguire alcun trattamento anticrittogamico, può farlo in tempi brevi utilizzando prodotti a base di ossicloruro di rame o dodina, altrimenti si rinvia il tutto a dopo l'allegagione.

Concimazione: chi non ha ancora eseguito la concimazione, può distribuire l'azoto frazionato in 2-3 volte; le dosi per oliveti con produzioni medie di 40 q.li/Ha. sono:  
Azoto kg. 60-80;  
Fosforo (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) Kg. 30-50;  
Potassio (K<sub>2</sub>O) Kg. 60-80.

### Previsioni del tempo

Rilevate dal sito web del Dipartimento specialistico regionale idrometeorologico dell'Arpas.

#### Venerdì 6 maggio 2011

Cielo poco nuvoloso. Possibile formazione di nebbie o foschie mattutine.  
Temperature: stazionarie o in lieve aumento.  
Venti: deboli o moderati da Sud-Est.  
Mari: poco mossi o mossi.

#### Sabato 7 maggio 2011

Cielo sereno o poco nuvoloso con aumento della nuvolosità alta in serata.  
Temperature: minime stazionarie o in lieve calo nelle prime ore del giorno, massime senza variazioni di rilievo.  
Venti: deboli o moderati da Sud-Est. Rinforzi in mattinata sul Sulcis-Iglesiente.  
Mari: mossi, localmente molto mossi.

#### Tendenza per i giorni successivi

Domenica e lunedì si avranno condizioni di copertura medio-alta associata a possibili deboli precipitazioni. Le temperature minime tenderanno ad aumentare, le massime si manterranno stazionarie. I venti soffieranno deboli variabili in rotazione dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

## Notiziario fitosanitario per l'area della Gallura

N. 4/2011 - Valido per il periodo:  
24 maggio - 05 giugno 2011

### Consigli colturali



#### Vite

Località: Olbia – Berchiddeddu – Arzachena

Fase fenologica: fioritura

Località: Monti- Berchidda- Oschiri

Fase fenologica: grappoli visibili-grappoli separati


Le condizioni climatiche del periodo con sole e temperature in rialzo giovano allo stato vegetativo della vite. Le zone base (Olbia, Arzachena, Berchiddeddu ecc) sono in fase di fioritura e dovrebbero avere fatto il trattamento per mettere in sicurezza la pianta da attacchi in questa delicata fase se non è opportuno procedere ad un trattamento a base di prodotto endoterapico (Dimetomorf, Iprovalicarb, Mandipropamide, Metalaxil, ecc.) in combinazione con un prodotto di contatto (Folpet, Mancozeb, Metiram), evitare composti a base di Rame in quanto ha azione fitotossica sui fiori. Si consiglia di intervenire in combinazione al trattamento antiperonosporico con un prodotto endoterapico contro l'oidio (Trifloxistrobin, Spiroxamin, Penconazolo, Metrafenone, ecc.).

Per le località in cui la fioritura è posticipata si consiglia di intervenire con prodotti translaminari in modo da coprire sino alla fioritura e predisporre il prossimo trattamento sistemico in prefioritura come sopra consigliato.

E' inoltre possibile sin da ora effettuare il diradamento dei germogli che determinano un eccessivo affastellamento eliminando preferibilmente quelli mal posizionati e privi di produzione. Si consiglia di asportare i germogli inseriti alla base del ceppo perchè difficilmente raggiungibili dal trattamento e quindi possibili inoculo dei funghi.

#### Rispettare le dosi in etichetta

**Distribuire la miscela su tutti i filari.**



#### Olivo

Areale: Budoni –

Olbia – Berchidda

Fase fenologica:  
fioritura

#### Avversità

Tignola (Prays oleae) – dalla installazione delle trappole per il monitoraggio di questo lepidottero, è stato rilevato il picco di cattura della generazione antofaga (a carico dei fiori);

solo in caso di accertata soglia di danno: infestazione delle infiorescenze superiore al 10 % sulle cv. da mensa e 40 % per le cv. da olio, si può eseguire un trattamento con *Bacillus Thuringiensis* var. *kurstaki*;

#### Consigli colturali

si consiglia di eseguire lo sfalcio o la trinciatura del manto erboso per ridurre la competizione idrica durante la fase della fioritura – allegagione.

Per chi non l'avesse già fatto si consiglia, entro il mese di maggio, di rimuovere o bruciare i residui di ramaglie derivanti dalla potatura, onde evitare i danni sui giovani germogli da parte del fleotribo.

### Previsioni del tempo

Rilevate dal sito web del Dipartimento specialistico regionale idrometeorologico dell'Arpas

#### Previsioni per martedì 24 maggio

Cielo poco nuvoloso con passaggi di nubi medio-alte in mattinata. Addensamenti pomeridiani nelle zone interne associati a possibili isolati rovesci.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve calo. Venti: deboli a regime di brezza. Mari: poco mossi o mossi.

#### Previsioni per mercoledì 25 maggio

Cielo poco nuvoloso. Addensamenti pomeridiani nelle zone interne associati a isolati rovesci.

Temperature: in lieve aumento. Venti: deboli a regime di brezza. Mari: poco mossi.

#### Tendenza per i giorni successivi

Per le giornate di giovedì e venerdì si prevede cielo poco nuvoloso salvo locali addensamenti associati a possibili rovesci pomeridiani. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo. I venti soffieranno deboli a regime di brezza. Mari poco mossi.



## Notiziario fitosanitario per l'area della Gallura

N. 5 /2011 - Valido per il periodo:  
10/06/2011 - 22/06/2011

### Consigli colturali



#### Vite

Località: Olbia – Berchiddeddu – Arzachena  
Fase fenologica: allegaggione- acino grano di pepe

Località: Monti- Berchidda- Oschiri

Fase fenologica: prefioritura- fioritura

Le abbondanti piogge verificatesi nei giorni scorsi mettono a rischio la vegetazione da attacchi fungini.

Peronospora: Le località in fase di prefioritura e fioritura dovrebbero aver effettuato un trattamento a copertura della delicata fase fenologica.

Anche se dai rilievi in campo non si evidenziano infezioni in atto, si consiglia di continuare la pretezione con prodotti che hanno la proprietà di legarsi alle cere cuticolari: bentiavalicarb, famoxadone ciazofamide.

In caso di infezioni peronosporiche evidenti si consiglia l'utilizzo di cimoxanil o dimetomorf e un successivo intervento dopo 2/3 giorni con prodotti a tre vie.

Oidio: Con il trattamento antiperonosporico è importante aggiungere anche prodotti antioidici. In particolare nei vigneti dove l'anno scorso si sono verificati attacchi si consiglia di associare Zolfo bagnabile micronizzato in miscela con prodotti endoterapici: quinoxifen, triazoli (miclobutanil, tebuconazolo, penconazolo, propiconazolo, triadimenol), spiroxamina, trifloxystrobin.

Vista la normativa nazionale sui fitofarmaci si informano tutti gli agricoltori che è fatto obbligo in azienda la tenuta e la corretta compilazione di un registro completo dei trattamenti a cui devono essere allegate le ricevute o fatture d'acquisto.



#### Olivo

Areale: Budoni – Olbia – Berchidda

Fase fenologica: allegaggione

Cicloconio (*Spilocaea oleaginea*), Cercosporiosi (*Mycocentrospora cladosporioides*): a seguito delle recenti piogge ed in considerazione della particolare sensibilità della cv. Bosana a questa malattia, o in oliveti con presenza di infezioni, è consigliabile intervenire con prodotti a base di rame o dodina;

Tignola (*Prays oleae*): le catture di adulti del microlepidottero, rilevate con le trappole a feromoni, hanno avuto un incremento nell'ultimo periodo, si consiglia di eseguire un controllo su frutticini per rilevare l'infestazione di uova e larve e valutare la soglia di intervento (5% cv da tavola, 15% cv da olio) prima di procedere nei trattamenti con prodotti citotropici (Dimetoato);

### Previsioni del tempo

Rilevate dal sito web del Dipartimento specialistico regionale idrometeorologico dell'Arpas

#### Previsioni per sabato 11 giugno 2011

Cielo inizialmente nuvoloso con deboli precipitazioni sulla Sardegna orientale, poco nuvoloso in serata.

Temperature: senza variazioni significative. Venti: deboli da Ovest Nord-Ovest in rinforzo dalla tarda mattinata.

Mari: molto mosso il Mar Tirreno, poco mossi o mossi gli altri mari.

#### Previsioni per domenica 12 giugno 2011

Cielo poco nuvoloso con il passaggio di nubi alte.

Temperature: minime in diminuzione al Nord e stazionarie altrove, massime senza variazioni di rilievo.

Venti: deboli da Nord-Ovest, rinforzi nelle ore centrali della giornata.

Mari: mossi o molto mossi con moto ondoso in attenuazione.

#### Tendenza per i giorni successivi

Per le giornate di lunedì e martedì avremo cielo poco nuvoloso. Le temperature aumenteranno in entrambi i valori. I venti soffieranno deboli variabili lunedì ed a regime di brezza l'indomani. I mari saranno poco mossi o mossi.

## Notiziario fitosanitario per l'area della Gallura

N. 6/2011 - Valido per il periodo:  
08 luglio – 23 luglio 2011

### Consigli colturali



#### Vite

Località: Olbia – Berchiddeddu – Arzachena

Fase fenologica: Chiusura grappolo

Località: Monti- Berchidda- Oschiri

Fase fenologica: Accrescimento grappolo

#### Peronospora

Dai rilievi in campo non si evidenziano infezioni in atto, si consiglia di continuare la pretezione con prodotti ad azione preventiva a base di rame.

In caso di infezioni peronosporiche evidenti si consiglia l'utilizzo di cimoxanil o dimetomorf e un successivo intervento dopo 2/3 giorni con prodotti a tre vie.

#### Oidio

Dai rilievi in campo si sono manifestati alcuni focolai, in particolare su vatietà sensibili, pertanto si consiglia di aggiungere al trattamento antiperonosporico anche prodotti antioidici. In particolare nei vigneti dove l'anno scorso si sono verificati attacchi si consiglia di associare Zolfo bagnabile micronizzato in miscela con prodotti endoterapici: quinoxifen, triazoli (miclobutanil, tebuconazolo, penconazolo, propiconazolo, triadimenol), spiroxamina, trifloxystrobin.

Considerando il decorso asciutto della stagione si consiglia di intervenire con irrigazioni di soccorso.

Vista la normativa nazionale sui fitofarmaci si informano tutti gli agricoltori che è fatto obbligo in azienda la tenuta e la corretta compilazione di un registro completo dei trattamenti a cui devono essere allegate le ricevute o fatture d'acquisto.

### Previsioni del tempo

#### Venerdì 8 luglio 2011

Cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: in aumento.

Venti: deboli o moderati meridionali, in attenuazione.

Mari: mossi.

#### Sabato 9 luglio 2011

Cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: in aumento.

Venti: deboli meridionali.

Mari: mossi.

#### Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di domenica e lunedì saranno caratterizzate da cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature tenderanno ad aumentare. I venti soffieranno deboli variabili. Mari poco mossi.

## Notiziario fitosanitario per l'area della Gallura

N. 8/2011 - Valido per il periodo:  
12 luglio - 23 luglio 2011

### Consigli colturali



#### Olivo

Fase fenologica:  
accrescimento frutto

Mosca delle olive  
(*Bactrocera oleae*):  
si è provveduto alla  
installazione delle  
trappole  
cromotropiche (gialle)  
in diversi areali del  
vasto comprensorio,  
(Budoni-San Teodoro,  
Olbia, Berchidda,

Oschiri).

Tignola (*Prays oleae*): dai controlli delle trappole, con la cattura degli adulti, e da un successivo controllo sulle drupe di larvette in penetrazione, la soglia di intervento è stata superata, per cui si consiglia, solo in caso di accertata infestazione, di eseguire il trattamento con dimetoato.

#### Irrigazione di soccorso:

in questa particolare fase, considerate le alte temperature dell'ultimo periodo, per chi dispone di impianto irriguo, si suggerisce di intervenire con delle irrigazioni di soccorso onde evitare lo stato di stress idrico e consentire così l'accrescimento dei frutti per suddivisione cellulare, nel contempo si ridurrebbe la cascola e si otterrebbe un maggior sviluppo dei germogli dell'anno;

#### Giornata informativa:

Il 16 luglio 2011 presso il Centro Polivalente del Comune di Padru alle ore 18,30 si terrà un incontro sulle strategie di difesa fitosanitaria dell'olivo;



#### Vite

Località: Olbia – Berchiddeddu  
– Arzachena

Fase fenologica: chiusura  
grappolo

Località: Monti- Berchidda-  
Oschiri -

Fase fenologica:  
accrescimento grappolo

Peronospora: Dai rilievi in  
campo non si evidenziano  
infezioni in atto, si consiglia di

continuare la protezione con prodotti ad azione preventiva a base di rame.  
In caso di infezioni peronosporiche evidenti si consiglia l'utilizzo di cimoxanil o dimetomorf e un successivo intervento dopo 2/3 giorni con prodotti a tre vie.

Oidio: Dai rilievi in campo si sono manifestati alcuni focolai, in particolare su varietà sensibili, pertanto si consiglia di aggiungere al trattamento antiperonosporico anche prodotti antioidici. In particolare nei vigneti dove l'anno scorso si sono verificati attacchi si consiglia di associare Zolfo bagnabile micronizzato in miscela con prodotti endoterapici: quinoxifen, triazoli (miclobutanil, tebuconazolo, penconazolo, propiconazolo, triadimenol), spiroxamina, trifloxystrobin.

Considerando il decorso asciutto della stagione si consiglia di intervenire con irrigazioni di soccorso.

Vista la normativa nazionale sui fitofarmaci si informano tutti gli agricoltori che è fatto obbligo in azienda la tenuta e la corretta compilazione di un registro completo dei trattamenti a cui devono essere allegate le ricevute o fatture d'acquisto.



## Notiziario fitosanitario per l'area della Gallura

N. 9/2011 - Valido per il periodo:  
01 Agosto - 15 Agosto 2011

### Consigli colturali



#### Olivo

Fase fenologica: completo indurimento nocciolo  
- accrescimento frutto;

#### Mosca delle olive (*Bactrocera oleae*)

le condizioni climatiche dell'ultimo periodo, in particolare gli abbassamenti termici, hanno determinato le condizioni più favorevoli allo sviluppo della popolazione di mosca dell'olivo; dal controllo settimanale delle catture di adulti con trappole cromotropiche (gialle) ubicate in aziende degli areali olivicoli del territorio di competenza "Budoni, San Teodoro, Olbia, Berchidda, Oschiri, Palau,

Arzachena", si è rilevato un forte incremento dell'attività riproduttiva.

Infatti, da un successivo controllo sui frutti campionati, si sono evidenziate numerose punture fertili con presenza di uova e larve di 1ª età, spesso concentrate anche su una singola drupa. L'infestazione attiva determinata supera abbondantemente la soglia d'intervento (10-15%), variando da un minimo del 55% a un max del 95%. Pertanto, visto e considerata l'alta percentuale d'infestazione in atto e il permanere delle condizioni climatiche favorevoli, si consiglia di eseguire tempestivamente un trattamento curativo con principi attivi ad azione citotropica e/o sistemica (dimetoato, fosmet, imidacloprid);

Si raccomanda la corretta modalità distributiva con le dosi indicate in etichetta e la registrazione nel registro dei trattamenti.

### Previsioni del tempo

#### Martedì 2 agosto 2011

Cielo sereno salvo passaggi di nubi alte in serata.

Temperature: in aumento, più sensibile nei valori massimi.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mari: poco mossi, localmente mossi.

#### Mercoledì 3 agosto 2011

Cielo sereno con aumento della nuvolosità medio-alta in tarda serata.

Temperature: in aumento, più sensibile nei valori minimi.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mari: poco mossi o mossi.

#### Tendenza per i giorni successivi

La prima parte della giornata di giovedì sarà caratterizzata da cielo nuvoloso per la presenza di nubi medio-alte.

Attenuazione della copertura dalla serata e per tutto il giorno seguente. Le temperature minime aumenteranno giovedì e rimarranno stazionarie il giorno seguente, mentre le massime non subiranno sostanziali variazioni. I venti soffieranno deboli da Ovest giovedì e deboli variabili il giorno dopo. I mari saranno poco mossi.



## Notiziario fitosanitario per l'area della Gallura

N. 10/2011 - Valido per il periodo:  
29 agosto al 09 settembre

### Consigli colturali



#### Vite

**Località:** Olbia – Berchiddeddu – Arzachena

**Fase fenologica:** maturazione

**Località:** Monti- Berchidda- Oschiri

**Fase fenologica:** maturazione

La stabilità atmosferica che sta caratterizzando quest'ultimo periodo, ha determinato un andamento meteo tipicamente estivo con temperature ed umidità elevate. Ciò ha causato forti stress in molti vigneti, soprattutto in quelli non irrigati, è consigliabile tagliare i grappoli compromessi per cercare di portare a termine quelli con meno danni.

Dai rilievi in campo non si evidenziano infezioni in atto

Vista la normativa nazionale sui fitofarmaci si informano tutti gli agricoltori che è fatto obbligo in azienda la tenuta e la corretta compilazione di un registro completo dei trattamenti a cui devono essere allegate le ricevute o fatture d'acquisto.

### Previsioni del tempo

#### Martedì 30 agosto 2011

Cielo irregolarmente nuvoloso. Possibili foschie mattutine.

Temperature: in aumento.

Venti: deboli occidentali con rinforzi sulle Bocche di Bonifacio.

Mari: poco mossi, localmente mossi.

#### Mercoledì 31 agosto 2011

Cielo poco nuvoloso con passaggi di nubi alte in serata.

Foschie mattutine.

Temperature: in aumento.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

#### Tendenza per i giorni successivi

Per le giornate di giovedì e venerdì si avrà cielo velato per la presenza di nubi alte. Le temperature tenderanno ad aumentare. I venti soffieranno deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

## Notiziario fitosanitario per l'area della Gallura

N. 11/2011 - Valido per il periodo:  
23 settembre - 07 ottobre 2011

### Consigli colturali



#### Olivo

Fase fenologica: accrescimento frutto – inizio invaiatura

#### Difesa - Mosca dell'olivo (Bactrocera oleae)

Dai rilievi settimanali delle catture di adulti dell'insetto, eseguiti nelle stazioni di monitoraggio con l'ausilio delle trappole cromotropiche (gialle), si è potuto constatare, a seguito delle condizioni climatiche favorevoli, un incremento di catture di adulti. Ad un successivo controllo sui campioni di drupe mediante binoculare, si è riscontrata una infestazione attiva di uova e larve superiore alla soglia di intervento.

Pertanto, visto il perdurare delle condizioni ottimali all'attività di ovi-deposizione della mosca, si consiglia, per chi non l'avesse ancora eseguito, di intervenire in tempi brevi con prodotti citotropici a base di Dimetoato, Fosmet, Imidacloprid, alle dosi indicate in etichetta e con il rispetto del numero massimo di trattamenti consentiti nell'anno.

A coloro che hanno adottato la lotta adulticida con esca Spintor Fly, si suggerisce di eseguire il controllo della infestazione attiva sui frutti e di continuare i trattamenti a turni di 8 – 10 gg. al fine di tenere bassa la popolazione della mosca.

Si avvisa l'obbligatorietà della registrazione delle operazioni colturali sul quaderno di campagna.

Per particolari situazioni e/o ulteriori approfondimenti rivolgersi al tecnico del SUT Gallura ai numeri telefonici sottoindicati.

### Notizie

Si informa che si stanno programmando i corsi per il patentino verde, gli interessati devono presentare la domanda alla Provincia Olbia-Tempio. Per ulteriori informazioni rivolgersi al SUT Gallura.