

Notiziario fitosanitario per l'area del Mandrolisai

N. 1/2011 - valido per il periodo:
9 maggio – 16 maggio

Consigli colturali



Vite

Fase fenologica: grappoli visibili

Peronospora: viste le piogge infettanti dei giorni scorsi, per chi non ha ancora effettuato nessun trattamento controlla peronospora, si consigliano interventi preventivi e curativi a base di cimoxanil e femoxadone in miscela con prodotti di copertura.

Oppure interventi con sistemici, quali dimetomorf, metalaxil, Fosetil-al, iprovalicarb sempre associati con prodotti di copertura. Tali interventi andranno ripetuti fra circa 8 giorni.

Chi ha effettuato trattamenti antiperonosporici con prodotti di copertura, a base di ditiocarbammati (mancozeb, metiram), prosegue con il loro utilizzo, anche perché, come

regola, in questo periodo, sono questi i prodotti da preferire.

Oidio: effettuare trattamenti antioidici solamente ove si temono attacchi precoci, con: AQ10 miscelato con olio estivo all'0,1/0,2%, da ripetere almeno un'altra volta a distanza di 7 giorni (se dato con altri principi attivi valutarne la compatibilità). Altri prodotti consigliati: zolfo, azoxistrobin, quinoxifen, trifloxistrobin.



Olivo

Fase fenologica: inizio mignolatura

L'andamento climatico particolarmente umido fa registrare un aumento della pressione del fungo *Spilocea oleagina* (Occhio di pavone). Si consiglia pertanto un intervento a base di rame ai fini eradicanti, che determina una caduta delle foglie infette e conseguente riduzione

del potenziale d'inoculo.

Notizie


Patentino verde: mercoledì 11 maggio, ore 18,30 C/o la sala comunale di Atzara si terrà la lezione sulla Sicurezza e prevenzione, registro trattamenti, problematiche inerenti l'inquinamento ambientale e lo smaltimento dei residui dei presidi sanitari e loro contenuti.

Inoltre, a breve, verranno attivati altri 3 corsi, uno da realizzarsi ad Atzara, uno a Sorgono e uno ad Ortueri. Si ricorda che la domanda per partecipare al corso dovrà essere presentata alla Provincia Di Nuoro.

Notiziario fitosanitario per l'area del Mandrolisai

N. 2/2011 - valido per il periodo:
13 maggio – 23 maggio

Consigli colturali



Vite

Fase fenologica: da grappoli visibili a grappoli separati

Peronospora: proseguire la difesa antiperonosporica secondo le linee di intervento indicate la settimana scorsa, ovvero: per chi non ha ancora effettuato nessun trattamento, si consigliano interventi preventivi e curativi a base di cimoxanil o femoxadone in miscela con prodotti di copertura. Oppure interventi con sistemici, quali: dimetomorf, metalaxil, Fosetil-al, iprovalicarb, sempre associati con prodotti di copertura.

Chi ha effettuato trattamenti antiperonosporici con prodotti di copertura, a base di ditiocarbammati (mancozeb, metiram), prosegue con il loro utilizzo, anche perché, come

regola, in questo periodo, sono questi i prodotti da preferire.

Oidio: effettuare trattamenti antioidici solamente ove si temono attacchi precoci, con: AQ10 miscelato con olio estivo all'0,1/0,2%, da ripetere almeno un'altra volta a distanza di 7 giorni (se dato con altri principi attivi valutarne la compatibilità). Altri prodotti consigliati: zolfo, azoxistrobin, quinoxifen, trifloxistrobin.



Olivo

Fase fenologica: inizio mignolatura

L'andamento climatico particolarmente umido fa registrare un aumento della pressione del fungo *Spilocea oleagina* (Occhio di pavone). Si consiglia pertanto un intervento a base di rame ai fini eradicanti, che determina una caduta delle foglie infette e conseguente riduzione

del potenziale d'inoculo.

Notizie

Patentino verde: mercoledì 18 maggio, ore 18,30, c/o la sala comunale di Atzara si terrà l'ultima lezione del corso.

Il giorno giovedì 19 maggio alle ore 10,00, sempre ad Atzara, è previsto l'esame finale.

Inoltre, a breve, verranno attivati altri 3 corsi, uno da realizzarsi ad Atzara, uno a Sorgono e uno ad Ortueri.

Si ricorda che la domanda per partecipare al corso dovrà essere presentata alla Provincia Di Nuoro.

Notiziario fitosanitario per l'area del Mandrolisai

N. 3/2011 - valido per il periodo:
13 Giugno – 20 giugno

Consigli colturali



Vite

Fase fenologica: da Bottoni fiorali separati a inizio fioritura

Peronospora: Le piogge dei giorni scorsi, hanno attivato dei focolai di peronospora. Si consiglia, pertanto, di eseguire il trattamento con sistemici, abbinato a prodotti di copertura e citotropici.

Si consigliano:

In copertura: mancozeb, metiram.

Sistemici: iprovalicarb, fluopicolide, fosetil alluminio, metalaxil, benalaxil

Citotropici: cimoxanil e dimetomorf.

E' consigliabile, infine, l'alternanza dei principi attivi.

Oidio: Utilizzare prodotti a base di zolfo, in miscela con prodotti endoterapici: spiroxamina, trifloxystrobin, quinoxifen e triazoli (Tebuconazolo, penconazolo, propiconazolo, ect)



Olivo

Fase fenologica: fioritura

Nella stazione di riferimento non si segnalano particolari problemi.

Comunque, in questo periodo, in alcuni oliveti è possibile che si verifichino lievi attacchi di cotonello, il fenomeno si controlla facilmente con uno sfoltimento della chioma.

Per chi ha problemi di allegagione si consiglia, in questa fase, un trattamento fogliare a base di boro.

Notizie

Patentino verde: a breve, verranno attivati 3 corsi, uno da realizzarsi ad Atzara, uno a Sorgono e uno ad Ortueri. Si ricorda che la domanda per partecipare al corso dovrà essere presentata alla Provincia Di Nuoro.

Notiziario fitosanitario per l'area del Mandrolisai

N. 4/2011 - valido per il periodo:
16 – 28 giugno 2011

Consigli colturali



Vite

Fase fenologica: fine fioritura – allegagione

Peronospora: Si consiglia, di eseguire trattamenti con sistemici o citotropici (iprovalicarb, fluopicolide, fosetil alluminio, metalaxil, benalaxil – cimoxanil e dimetomorf) in miscela con prodotti di copertura (mancozeb, metiram, ossicloruro di rame).

E' consigliabile l'alternanza dei principi attivi.

Oidio: Nelle zone a basso rischio di infezione si consiglia di usare prodotti a base di zolfo.

Nelle zone ad alto rischio si consigliano prodotti sistemici: spiroxamina, trifloxystrobin, quinoxifen e triazoli

(Tebuconazolo, penconazolo, propiconazolo, ect) addizionati con lo zolfo.



Olivo

Fase fenologica: allegagione

Nella stazione di riferimento non si segnalano particolari problemi.

Comunque, in questo periodo, in alcuni oliveti è possibile che si verifichino lievi attacchi di cotonello, il fenomeno si controlla facilmente con uno sfoltimento della chioma.

Per chi ha problemi di allegagione si consiglia , in questa fase, un trattamento fogliare a base di boro.

Notizie

Patentino verde: A breve, verranno attivati 3 corsi, uno da realizzarsi ad Atzara, uno a Sorgono e uno ad Ortueri.

Si ricorda che la domanda per partecipare al corso dovrà essere presentata alla Provincia Di Nuoro.

Notiziario fitosanitario per l'area del Mandrolisai

N. 5/2011 - valido per il periodo:
7 Luglio – 19 Luglio 2011

Consigli colturali



Vite

Fase fenologica: ingrossamento acini

Peronospora: dai rilievi effettuati nei vigneti sottoposti a controllo non sono state segnalate infezioni peronosporiche.

Si consiglia, comunque, di proseguire la difesa della vite con trattamenti a base di rame (Poltiglia bordolese, ossicloruro di rame).

Oidio: nelle zone a basso rischio di infezione si consiglia di usare prodotti a base di zolfo.

Nelle zone ad alto rischio si consigliano

prodotti sistemici: spiroxamina, trifloxystrobin, quinoxifen e triazoli (Tebuconazolo, penconazolo, propiconazolo, ect) addizionati con zolfo.



Melo

Fase fenologica: frutto noce

Ticchiolatura: si segnalano infezioni di ticchiolatura, si consiglia di eseguire trattamenti di Copertura con ziram,

mancozeb, metiram, ditianon.

Oidio: si consiglia di effettuare trattamenti a base di zolfo, solamente nei meletti colpiti dall'infezione.

Carpocapsa (verme delle mele): per la difesa contro la carpocapsa, sarebbe opportuno rivolgersi, sin da ora, al SUT Mandrolisai.



Olivo

Nella stazione di riferimento non si segnalano particolari problemi.

Mosca dell'olivo: in questa fase, sarebbe opportuno iniziare ad installare le trappole per il monitoraggio dell'insetto.

Notizie

Patentino verde: a breve, verranno attivati 3 corsi, uno da realizzarsi ad Atzara, uno a Sorgono e uno ad Ortueri.

Si ricorda che la domanda per partecipare al corso dovrà essere presentata alla Provincia Di Nuoro.

Incontri tecnici: il 14/15 luglio si terranno 2 giornate dimostrative di potature di fruttiferi. Per maggiori informazioni rivolgersi al SUT Mandrolisai.

Notiziario fitosanitario per l'area del Mandrolisai

N. 6/2011 - valido per il periodo:
20 luglio – 30 luglio 2011

Consigli colturali



Vite

Fase fenologica: accrescimento acini

Peronospora: dai rilievi effettuati nei vigneti sottoposti a controllo non sono state segnalate infezioni peronosporiche. Si consiglia, comunque, di proseguire la difesa della vite con trattamenti a base di rame (Poltiglia bordolese, ossicloruro di rame).

Oidio: Nelle zone a basso rischio di infezione si consiglia di usare prodotti a base di zolfo. Nelle zone ad alto rischio si consigliano

prodotti sistemici: spiroxamina, trifloxystrobin, quinoxifen e triazoli (Tebuconazolo, penconazolo, propiconazolo, ect) addizionati con zolfo



Olivo

Fase fenologica: inizio indurimento nocciolo

Mosca dell'olivo: In alcune stazioni, le catture settimanali per trappola hanno superato la soglia di pericolosità, le condizioni ambientali non rendono però necessario alcun intervento fitosanitario.



Melo

Fase fenologica: Frutto noce

Oidio: Si consiglia di effettuare trattamenti a base di zolfo, solamente nei meletti colpiti dall'infezione.

Carpocapsa (verme delle mele): Per la difesa contro la carpocapsa, sarebbe opportuno rivolgersi, sin da ora, al SUT Mandrolisai.

Notizie

Patentino verde: ad Ortueri, il giorno 25 luglio, alle ore 18,30, presso le scuole elementari si terrà la prima lezione del corso per il rilascio del patentino verde.

Si invitano le aziende aderenti alla mis. 214 del PSR az. 2 e az. 6 alla presentazione della richiesta di controllo delle macchine irroratrici, da indirizzare al SUT Mandrolisai.

Notiziario fitosanitario per l'area del Mandrolisai

N. 7/2011 - valido per il periodo:
25 luglio – 1 agosto 2011

Consigli colturali



Vite

Fase fenologica: accrescimento acini

Peronospora: dai rilievi effettuati nei vigneti sottoposti a controllo, non si sono evidenziate infezioni peronosporiche. Dopo la pioggia e le bagnature prolungate di questi giorni, si consiglia comunque di intervenire con trattamenti a base di rame (Poltiglia bordolese, Ossicloruro di rame). Nel caso si manifestino infezioni, trattare con miscele contenenti Fosetil-Al.

Oidio: nelle zone a basso rischio di infezione

si consiglia di usare prodotti a base di zolfo. Nelle zone ad alto rischio si consigliano prodotti sistemici, Spiroxamina, Trifloxystrobin, e triazoli (Tebuconazolo, Penconazolo, Propiconazolo, ect), addizionati con zolfo. Questi prodotti sistemici non devono essere impiegati più di tre volte l'anno.

Botrite o Muffa grigia: Nei vigneti in cui di solito si manifesta la malattia, intervenire poco prima della chiusura del grappolo con prodotti a base di Vinclozolin, FeneXamide.



Olivo

Fase fenologica: inizio indurimento nocciolo

Mosca dell'olivo: al momento non si ritiene necessario effettuare alcun intervento fitosanitario.



Melo

Fase fenologica: Frutto noce

Oidio: Si consiglia di effettuare trattamenti a base di zolfo, solamente nei meletti colpiti dall'infezione.

Carpocapsa (verme delle mele) e Ticchiolatura: Per la difesa contro queste avversità sarebbe opportuno rivolgersi direttamente al SUT Mandrolisai.

Notizie

Patentino verde: ad Ortueri, il giorno 25 luglio, alle ore 18,30, presso le scuole elementari si terrà la prima lezione del corso per il rilascio del patentino verde.

Si invitano le aziende aderenti alla mis. 214 del PSR az. 2 e az. 6 alla presentazione della richiesta di controllo delle macchine irroratrici, da indirizzare al SUT Mandrolisai.