

Notiziario fitosanitario per l'area del Sarrabus-Gerrei

N. 1/2011 - Valido per il periodo:
05 maggio - 12 maggio 2011

Consigli colturali



Agrumi

Fase fenologica: fioritura

Al momento non si segnalano particolari avversità da controllare.
Concimazione: effettuare una concimazione al terreno con fertilizzanti azotati in
dose di 300 gr. di unità fertilizzante a pianta.



Vite

Fase fenologica: grappoli separati.

Le precipitazioni e le temperature degli ultimi
giorni possono causare con molta probabilità
infezioni peronosporiche. Si consiglia quindi di
intervenire con prodotti endoterapici (flopliculide,
fosetil-al, metalaxil, benalaxil, dimetomorf,
piraclostrobin, ecc).

Aggiungere al trattamento anche un antiodico
(zolfo micronizzato, meptildinocap ecc.).

Oidio (*Erysiphe necator*): si consiglia di intervenire
in combinazione al trattamento antiperonosporico

con un prodotto a base di Zolfo bagnabile micronizzato (600 gr/hl) , Meptildinocap (50 cc/hl)
Spiroxamina (1,5 lit./ha).

Previsioni del tempo

Giovedì 5 maggio 2011

Cielo poco nuvoloso con formazione di nebbie o foschie
mattutine.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie o in
leggero aumento.

Venti: deboli variabili sulla Sardegna meridionale.

Deboli o moderati dai quadranti orientali altrove.

Venerdì 6 maggio 2011

Cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: stazionarie.

Venti: deboli o moderati da Sud-Est.

Tendenza per i giorni successivi

Per le giornate di sabato e domenica si avrà cielo poco
nuvoloso salvo passaggi di nubi alte. Le temperature
non subiranno variazioni di rilievo. I venti soffieranno
deboli o moderati da Sud-Est con rinforzi sul Canale di
Sardegna.

Notizie

Sono aperti i termini per presentare le domande di
pagamento e di prima adesione della **misura agro-
ambientale n. 214 del PSR 2007/2013**. Per ulteriori
informazioni rivolgersi presso gli uffici Laore di
Muravera/Castiadas o consultare il sito
www.sardegnaagricoltura.it

Notiziario fitosanitario per l'area del Sarrabus-Gerrei

N. 2/2011 - Valido per il periodo:
12 maggio - 19 maggio 2011

Consigli colturali



Vite

Fase fenologica: bottoni fiorali separati

Peronospora (*Plasmopara viticola*)

Date le condizioni climatiche i rischi di infezioni sono bassi. Eventuali interventi si consigliano solo dove si sono verificati in precedenza attacchi.

Oidio (*Erysiphe necator*)

Si consigliano trattamenti preventivi a base di zolfo in polvere o trattamenti liquidi a base di zolfo micronizzato, Meptil-dinocap o Spiroxamina. Nel caso in cui ci siano stati lievi attacchi di botrite si consiglia, invece, l'uso di prodotti con azione

collaterale antibotritica quali il Trifloxystrobin.

Operazioni colturali Si consiglia di effettuare operazioni di spollonatura ed eliminazione dei germogli soprannumerari sul capo a frutto e sugli speroni.



Agrumi

Fase fenologica: fioritura – caduta petali

Al momento non si segnalano particolari avversità da controllare.

Concimazione: effettuare una concimazione al terreno con fertilizzanti azotati in dose di 300 gr. di unità fertilizzante a pianta.

Previsioni del tempo

Previsioni per giovedì 12 maggio: cielo sereno.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento. Venti: deboli variabili.

Previsioni per venerdì 13 maggio: cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature: stazionarie o in lieve aumento. Venti: deboli a regime di brezza.

Tendenza per i giorni successivi: la giornata di sabato sarà caratterizzata da cielo sereno; per domenica è possibile un incremento della copertura nuvolosa. Le temperature minime tenderanno ad aumentare mentre le massime non subiranno sostanziali variazioni. I venti soffieranno deboli a regime di brezza tendenti al rinforzo e a disporsi dai quadranti occidentali domenica

Notizie

Si informa che gli interessati all'adesione **all'elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche**, dovranno inoltrare domanda entro il **23 maggio 2011** presso lo Sportello Unico Territoriale di Muravera.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici Laore di Muravera/Castiadas o consultare il sito www.sardegnaagricoltura.it

Notiziario fitosanitario per l'area del Sarrabus-Gerrei

N. 3/2011 - Valido per il periodo:
18 maggio - 26 maggio 2011

Consigli colturali



Vite

Fase fenologica: bottoni florali separati.

Peronospora (*Plasmopara viticola*)

Non vi sono condizioni climatiche di alto rischio. Dove si sono verificati attacchi in precedenza si consiglia d'intervenire con prodotti endoterapici quali (fluopicolide, fosetil-al, metalaxil, benalaxil, dimetomorf, ecc), negli altri casi non si consigliano trattamenti.

Oidio (*Erysiphe necator*): si consigliano

trattamenti preventivi a base di zolfo in polvere senza rame o trattamenti liquidi a base di zolfo

micronizzato o Spiroxamina. Nel caso in cui ci siano stati lievi attacchi di botrite si consiglia, invece, l'uso di prodotti con azione collaterale antibotritica quali il Trifloxystrobin.

Operazioni colturali Si consiglia di effettuare operazioni di spollonatura ed eliminazione dei germogli sopra numerari sul capo a frutto e sugli speroni.



Agrumi

Fase fenologica: caduta petali – allegagione

Dai controlli in campo risultano attacchi di afidi nella nuova vegetazione. Dove si rende necessario e la fase fenologica lo consente, effettuare un trattamento aficida con uno dei seguenti principi attivi: Imidacloprid, Thiamethoxam.

Si consiglia prima del trattamento di eseguire una sfoltitura della chioma eliminando le parti secche e fortemente infestate. Non si segnalano altre avversità da controllare.

Previsioni del tempo

Previsioni per giovedì 19 maggio 2011

Cielo velato con addensamenti più consistenti sul settore meridionale. Temperature: minime stazionarie, massime in lieve calo. Venti: deboli o moderati da Sud-Est.

Previsioni per venerdì 20 maggio 2011

Cielo coperto da nubi medio-alte con probabili precipitazioni sul settore meridionale. Temperature: minime in aumento, massime in diminuzione. Venti: deboli o moderati da Sud-Est.

Tendenza per i giorni successivi

Per il fine settimana cielo generalmente coperto da nubi medio-alte; non si escludono deboli precipitazioni sul settore meridionale. temperature in leggero aumento. Venti deboli da Sud-Est tendenti alla variabilità domenica.

Notizie

Si informa che gli interessati all'adesione **all'elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche**, dovranno inoltrare domanda entro il 23 maggio 2011 presso lo Sportello Unico Territoriale di Muravera. Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici Laore di Muravera/Castiadas o consultare il sito www.sardegnaagricoltura.it

Notiziario fitosanitario per l'area del Sarrabus-Gerrei

N. 4/2011 - Valido per il periodo:
26 maggio - 02 giugno 2011

Consigli colturali



Agrumi

Fase fenologica: allegagione

Dai controlli in campo risultano attacchi di afidi nella nuova vegetazione. Dove si rende necessario effettuare un trattamento aficida con uno dei seguenti principi attivi: Imidacloprid, Thiamethoxam, Pymetrozine.

Si consiglia prima del trattamento di eseguire una sfoltitura della chioma eliminando le parti secche e fortemente infestate. Non si segnalano altre avversità da controllare.

Irrigazione: eseguire almeno un turno irriguo ogni 7-10 giorni somministrando circa 250-300 mc/ha



Vite

Fase fenologica: bottoni fiorali separati – inizio fioritura.

Peronospora (*Plasmopara viticola*)

Non vi sono le condizioni di rischio.

Oidio (*Erysiphe necator*)

La fase fenologica in atto è quella di maggior pericolosità per l'insorgenza della malattia; pertanto si consigliano trattamenti preventivi a base di zolfo in polvere senza rame o trattamenti liquidi a base di zolfo micronizzato oppure utilizzare sistemici quali Spirooxamina, Penconazolo Trifloxystrobin etc.

Previsioni del tempo

Previsioni per giovedì 26 maggio 2011

Cielo sereno o poco nuvoloso. Nelle ore pomeridiane si avranno addensamenti più consistenti sui rilievi associati a isolati rovesci.

Temperature: stazionarie. Venti: brezze.

Previsioni per venerdì 27 maggio 2011

Cielo nuvoloso per la presenza di nubi medio-alte.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in leggero calo sul settore occidentale.

Venti: deboli o moderati da Ovest Nord-Ovest.

Tendenza per i giorni successivi

Per le giornate di sabato e domenica si prevede cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature subiranno una diminuzione. I venti soffieranno deboli o moderati da Nord-Ovest in attenuazione nel corso della giornata di domenica.

Notizie

Corsi Patentino Verde. I moduli di iscrizione possono essere ritirati presso gli uffici Laore di Muravera e Castiadas; si prevede l'organizzazione del prossimo corso a partire dalla prima settimana di settembre 2011. Le richieste dovranno essere spedite presso la sede della Provincia in Via G. Guglielmo 46 a Cagliari entro il mese di agosto 2011.

Notiziario fitosanitario per l'area del Sarrabus-Gerrei

N. 5/2011 - Valido per il periodo:
01 giugno - 09 giugno 2011

Consigli colturali



Agrumi

Fase fenologica: allegagione

Afidi. Dove si rende necessario effettuare un trattamento con uno dei seguenti principi attivi: Imidacloprid, Thiamethoxam, Pymetrozine. Si consiglia prima del trattamento di eseguire una sfoltitura della chioma eliminando le parti secche e

fortemente infestate. Non si segnalano altre avversità da controllare.

Irrigazione: eseguire almeno un turno irriguo ogni 7-10 giorni somministrando circa 250-300 mc/ha



Vite

Fase fenologica: fioritura.

Peronospora (*Plasmopara viticola*)

In via cautelativa, considerata la fase fenologica e le precipitazioni previste nei prossimi giorni, si suggeriscono interventi antiperonosporici in abbinamento a quelli antioidici. Si consigliano prodotti di copertura (folpet, mancozeb, metiram) in abbinamento a prodotti endoterapici (iprovalicarb, fluopicolide, dimetomorf o fosetil alluminio, etc.).

Oidio (*Erysiphe necator*):

La fase fenologica in atto è quella di maggior pericolosità per l'insorgenza della malattia; pertanto si consigliano trattamenti preventivi a base di zolfo in polvere senza rame o trattamenti liquidi a base di zolfo micronizzato oppure utilizzare sistemici quali Spiroxamina, Penconazolo Trifloxystrobin etc.

Erinosi

Si segnalano alcuni attacchi di acari eriofidi, pertanto si suggerisce l'utilizzo di prodotti a base di zolfo, impiegati anche contro l'oidio.

Previsioni del tempo

Previsioni per giovedì 2 giugno 2011

Cielo poco nuvoloso per la presenza di nubi alte.
Aumento della nuvolosità in tarda serata.

Temperature: minime in sensibile calo, massime stazionarie o in lieve aumento.

Venti: deboli di direzione variabile.

Previsioni per venerdì 3 giugno 2011

Cielo nuvoloso con possibili deboli piogge sparse.

Temperature: in aumento in entrambi i valori.

Venti: deboli da Nord-Est.

Tendenza per i giorni successivi

Per le giornate di sabato e domenica si prevede cielo nuvoloso e alta probabilità di pioggia. Le temperature minime tenderanno ad aumentare, mentre le massime diminuiranno sabato e aumenteranno il giorno seguente. I venti soffieranno deboli di direzione variabile.

Notizie

Corsi Patentino Verde. I moduli di iscrizione possono essere ritirati presso gli uffici Laore di Muravera e Castiadas; si prevede l'organizzazione del prossimo corso a partire dalla prima settimana di settembre 2011. Le richieste dovranno essere spedite presso la sede della Provincia in Via G. Guglielmo 46 a Cagliari entro il mese di agosto 2011.

Notiziario fitosanitario per l'area del Sarrabus-Gerrei

N. 6/2011 - Valido per il periodo:
09 giugno - 16 giugno 2011

Consigli colturali



Vite

Fase fenologica: allegagione

Oidio (*Erysiphe necator*):

Nel caso in cui si siano superati i tempi di carenza, si consigliano trattamenti preventivi, a base di zolfo in polvere, con rame nel caso in cui si siano riscontrate infezioni primarie di peronospora, oppure trattamenti liquidi a base di zolfo micronizzato o prodotti sistemici quali Spiroxamina, Penconazolo, quinoxifen Trifloxystrobin etc. (abbinati con antiperonosporici endoterapici in caso di infezione primarie di peronospora.)

Erinosi. Si segnalano alcuni attacchi di acari eriofidi, pertanto si suggerisce l'utilizzo di prodotti a base di zolfo, impiegati anche contro l'oidio.

Tecniche Colturali. Si consiglia la cimatura superato il settimo-ottavo nodo del germoglio, eliminando anche le foglie al di sotto dei grappoli per favorire l'aerazione e la penetrazione dei trattamenti fitosanitari.



Agrumi

Fase fenologica: ingrossamento frutti

Cocciniglia Rossa Forte (*Aonidiella Aurantii*): dalle stazioni di monitoraggio risulta raggiunta la soglia d'intervento, per cui si consiglia un trattamento a base di Piriproxifen da eseguire a partire dal 12/06/2011 al 20/06/2011.

Si segnalano inoltre attacchi di ragnetto rosso (*Tetranychus Urticae*). Se si supera la soglia del 10% di foglie con presenza di forme mobili, effettuare un trattamento con uno dei seguenti principi attivi: Exitiazox, Fenazaquin, Tebufenpirad. Non si segnalano altre avversità da controllare.

Irrigazione: eseguire almeno un turno irriguo ogni 7-10 giorni somministrando circa 250-300 mc/ha

Previsioni del tempo

Previsioni per giovedì 9 giugno 2011

Cielo poco nuvoloso salvo locali addensamenti in mattinata. Temperature: minime in aumento, massime stazionarie. Venti: deboli o moderati da Ovest Nord-Ovest, rinforzi sulle Bocche di Bonifacio.

Previsioni per venerdì 10 giugno 2011

Cielo poco nuvoloso con progressivo aumento della copertura medio-alta. Temperature: minime in diminuzione, massime in aumento. Venti: deboli in prevalenza dai quadranti occidentali.

Tendenza per i giorni successivi

Per la giornata di sabato avremo cielo poco nuvoloso con il passaggio di nubi alte, attenuazione della copertura l'indomani. Le temperature minime aumenteranno, le massime non subiranno variazioni significative. I venti soffieranno deboli da Nord-Ovest.

Notizie

Corsi patentino verde. I moduli di iscrizione possono essere ritirati presso gli uffici Laore di Muravera e Castiadas; si prevede l'organizzazione del prossimo corso a partire dalla prima settimana di settembre 2011. Le richieste dovranno essere spedite presso la sede della Provincia in Via G. Guglielmo 46 a Cagliari entro il mese di agosto 2011.

Notiziario fitosanitario per l'area del Sarrabus-Gerrei

N. 7/2011 - Valido per il periodo:
15 giugno - 23 giugno 2011

Consigli colturali



Vite

Fase fenologica: Pre-chiusura grappolo.

Oidio (*Erysiphe necator*):

Nel caso in cui si siano superati i tempi di carenza, si consigliano trattamenti preventivi, a base di zolfo in polvere, con rame nel caso in cui si siano riscontrate infezioni primarie di peronospora, oppure trattamenti liquidi a base di zolfo micronizzato o prodotti sistemici quali Spiroxamina, Penconazolo, quinoxifen Trifloxystrobin etc. (abbinati con antiperonosporici endoterapici in caso di infezione primarie di peronospora.)

Erinosi. Si segnalano alcuni attacchi di acari eriofidi, pertanto si suggerisce l'utilizzo di prodotti a base di zolfo, impiegati anche contro l'oidio.

Tecniche Colturali. Si consiglia la cimatura superato il settimo-ottavo nodo del germoglio, eliminando anche le foglie al di sotto dei grappoli per favorire l'areazione e la penetrazione dei trattamenti fitosanitari.



Agrumi

Fase fenologica: ingrossamento frutti

Cocciniglia Rossa Forte (*Aonidiella Aurantii*.) Si consiglia di ultimare il trattamento a base di Piriproxifen entro lunedì 20/06/2011

Si segnalano inoltre attacchi di ragnetto rosso (*Tetranychus Urticae*). Se si supera la soglia del 10% di foglie con presenza di forme mobili, effettuare un trattamento con uno dei seguenti principi attivi: Exitiazox, Fenazaquin, Tebufenpirad. Non si segnalano altre avversità da controllare.

Irrigazione: eseguire uno o due turni irrigui/settimana somministrando almeno 300 mc/ha.

Previsioni del tempo

Previsioni per giovedì 16 giugno 2011

Cielo sereno salvo addensamenti pomeridiani sui rilievi.
Temperature: in lieve aumento.
Venti: a regime di brezza.

Previsioni per venerdì 17 giugno 2011

Cielo sereno o poco nuvoloso.
Temperature: in lieve aumento.
Venti: a regime di brezza.

Tendenza per i giorni successivi

Per il fine settimana si prevede cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature aumenteranno sabato, mentre domenica potrebbero diminuire lievemente nei valori massimi. I venti soffieranno a regime di brezza in rinforzo e rotazione dai quadranti occidentali nella giornata di domenica.

Notizie

Si informano tutti gli operatori agricoli che il giorno 21 giugno 2011 alle ore 17.30 presso la sala polifunzionale delle scuole elementari di Villaputzu in via Nazionale, si terrà un incontro organizzato dalla ASL di Cagliari (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – S.Pre.S.A.L.) a scopo informativo e di approfondimento sui temi della sicurezza in agricoltura. Data l'importanza degli argomenti si prega di non mancare.

Notiziario fitosanitario per l'area del Sarrabus-Gerrei

N. 8/2011 - Valido per il periodo:
29 giugno - 07 luglio 2011

Consigli colturali



Vite

Fase fenologica: chiusura grappolo.

Oidio (*Erysiphe necator*)

Nel caso in cui si siano superati i tempi di carenza, si consigliano trattamenti preventivi, a base di zolfo in polvere, con rame nel caso in cui si siano riscontrate infezioni primarie di peronospora, oppure trattamenti liquidi a base di zolfo micronizzato o prodotti sistemici quali Spiroxamina, Penconazolo, quinoxifen Trifloxystrobin etc. (abbinati con antiperonosporici endoterapici in caso di infezione primarie di peronospora.)

Tecnica colturale: si consiglia la sfogliatura per facilitare l'arieggiamento e la penetrazione dei fitofarmaci nella fascia produttiva e la cimatura dove necessario.



Agrumi

Fase fenologica: ingrossamento frutti

Ragnetto rosso (*Tetranychus Urticae*). Se si supera la soglia del 10% di foglie con presenza di forme mobili, effettuare un trattamento con uno dei seguenti principi attivi: Exitiazox, Fenazaquin, Tebufenpirad. Non si segnalano altre avversità da

controllare.

Consigli colturali: eseguire uno o due turni irrigui/settimana somministrando almeno 300 mc/ha.

Concimazione: eseguire una concimazione azotata somministrando circa 40-50 unità fertilizzanti/ha.

Per le aziende che aderiscono al disciplinare di Produzione Integrata considerare i quantitativi di azoto già somministrati nel corso dei precedenti interventi.

Previsioni del tempo

Previsioni per giovedì 30 giugno 2011

Cielo sereno. Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime in diminuzione. Venti: deboli o moderati da Ovest Nord-Ovest, forti nelle Bocche di Bonifacio.

Previsioni per venerdì 1 luglio 2011

Cielo sereno. Temperature: minime in diminuzione, massime senza variazioni di rilievo. Venti: deboli o moderati da Ovest Nord-Ovest, a regime di brezza sulla Sardegna orientale.

Tendenza per i giorni successivi

Sabato avremo cielo velato per il passaggio di nubi medio-alte, sereno o poco nuvoloso l'indomani. Temperature minime stazionarie, massime stazionarie sabato in aumento domenica. I venti soffieranno deboli o moderati da Ovest Nord-Ovest e a regime di brezza sulla Sardegna orientale sabato, a regime di brezza il giorno seguente.

Notizie

Corsi Patentino Verde. I moduli di iscrizione possono essere ritirati presso gli uffici Laore di Muravera e Castiadas; si prevede l'organizzazione del prossimo corso a partire dalla prima settimana di settembre 2011. Le richieste dovranno essere spedite presso la sede della Provincia in Via G. Guglielmo 46 a Cagliari entro il mese di agosto 2011.

Notiziario fitosanitario per l'area del Sarrabus-Gerrei

N. 9/2011 - Valido per il periodo:
07 luglio - 14 luglio 2011

Consigli colturali



Agrumi

Fase fenologica: ingrossamento frutti

Ragnetto rosso (*Tetranychus Urticae*): se si supera la soglia del 10% di foglie con presenza di forme mobili, effettuare un trattamento con uno dei seguenti principi attivi: Exitiazox, Fenazaquin, Tebufenpirad. Non si segnalano altre avversità da controllare.

Consigli colturali: eseguire uno o due turni irrigui/settimana somministrando almeno 300 mc/ha.

Concimazione: eseguire una concimazione azotata somministrando circa 40–50 unità fertilizzanti/ha.

Per le aziende che aderiscono al disciplinare di Produzione Integrata considerare i quantitativi di azoto già somministrati nel corso dei precedenti interventi.



Vite

Fase fenologica: pre-chiusura grappolo.

Oidio (*Erysiphe necator*): Nel caso in cui si siano superati i tempi di carenza, si consigliano trattamenti preventivi, a base di zolfo bagnabile micronizzato per evitare problemi di ustioni, oppure trattamenti con prodotti sistemici quali Spiroxamina, Penconazolo, quinoxifen Trifloxystrobin etc. (abbinati con antiperonosporici endoterapici in caso di infezione primarie di

peronospora.)

Botrite: per le vigne particolarmente soggette ad attacco, dovute alle condizioni di alta fertilità del suolo, condizioni di umidità e di varietà con grappolo serrato, si consiglia in questa fase in via preventiva, un trattamento sulla fascia produttiva con prodotti a base di: fenexamide, ciprodinil + fludioxonil, mepanipirym, pirimetanil, boscalid (antibotritico con azione antioidica).

Cicaline (*Empoasca Vitis*). In alcuni vigneti si segnala la sua presenza; al superamento della soglia di danno pari a due individui per foglia, si consiglia di intervenire con prodotti a base di Clorpirifos, Clorpirifos Metile o, per le aziende che aderiscono al regime di produzione integrata impiegare Thiametoxam.

Tignoletta: (*Lobesia Botrana*) dai controlli in campo non si è ancora raggiunta la soglia d'intervento.

Tecnica colturale: Se necessario effettuare leggere sfogliature per migliorare la penetrazione dei fitofarmaci durante i trattamenti e arieggiare i grappoli; le cimature sono necessarie specie nelle spalliere in cui le cime causano ombreggiamento. In questa fase, nel caso sia necessario, nelle vigne che hanno superato 3 anni di vita, si possono eseguire le operazioni di diserbo delle erbe infestanti perenni (es: gramigna e convolvolo) con l'uso di glifosate, si raccomanda l'uso di campane protettive e l'esecuzione dei trattamenti in assenza di vento affinché il prodotto non vada ad investire le parti verdi della vite.

Previsioni del tempo

Giovedì 7 luglio 2011

Cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: in aumento.

Venti: deboli variabili in rotazione dai quadranti meridionali.

Venerdì 8 luglio 2011

Cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: in aumento.

Venti: deboli o moderati meridionali.

Tendenza per i giorni successivi

Per le giornate di sabato e domenica si prevede cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature subiranno un ulteriore aumento. I venti soffieranno deboli variabili.

Notizie

Corsi Patentino Verde. I moduli di iscrizione possono essere ritirati presso gli uffici Laore di Muravera e Castiadas; si prevede l'organizzazione del prossimo corso a partire dalla prima settimana di settembre 2011. Le richieste dovranno essere spedite presso la sede della Provincia in Via G. Guglielmo 46 a Cagliari entro il mese di agosto 2011.

Notiziario fitosanitario per l'area del Sarrabus-Gerrei

N. 10/2011 - Valido per il periodo:
14 luglio - 21 luglio 2011

Consigli colturali



Agrumi

Fase fenologica: ingrossamento frutti

Ragnetto rosso (*Tetranychus Urticae*): se si supera la soglia del 10% di foglie con presenza di forme mobili, effettuare un trattamento con uno dei seguenti principi attivi: Exitiazox, Fenazaquin, Tebufenpirad. Non si segnalano altre avversità da controllare. Consigli colturali: eseguire uno o due turni irrigui/settimana somministrando almeno 350 mc/ha.

Concimazione: eseguire una concimazione azotata somministrando circa 40–50 unità fertilizzanti/ha. Per le aziende che aderiscono al disciplinare di Produzione Integrata considerare i quantitativi di azoto già somministrati nel corso dei precedenti interventi.



Vite

Fase fenologica: pre-chiusura grappolo.

Oidio (*Erysiphe necator*): Nel caso in cui si siano superati i tempi di carenza, si consigliano trattamenti preventivi, a base di zolfo bagnabile micronizzato per evitare problemi di ustioni, oppure trattamenti con prodotti sistemici quali Spiroxamina, Penconazolo, quinoxifen Trifloxystrobin etc. (abbinati con antiperonosporici endoterapici in caso di infezione primarie di peronospora.)

Botrite: per le vigne particolarmente soggette ad attacco, dovute alle condizioni di alta fertilità del suolo, condizioni di umidità e di varietà con grappolo serrato, si consiglia in questa fase in via preventiva, un trattamento sulla fascia produttiva con prodotti a base di: fenexamide, ciprodinil + fludioxonil, mepanipirym, pirimetanil, boscalid (antibotritico con azione antioidica).

Cicaline (*Empoasca Vitis*): In alcuni vigneti si segnala la sua presenza; al superamento della soglia di danno pari a due individui per foglia, si consiglia di intervenire con prodotti a base di Clorpirifos, Clorpirifos Metile o, per le aziende che aderiscono al regime di produzione integrata impiegare Thiametoxam.

Tignoletta: (*Lobesia Botrana*) dai controlli in campo si è raggiunta la soglia d'intervento, tuttavia, data la fase fenologica, si consiglia di intervenire solo dove normalmente si riscontrano particolari problemi. Negli altri casi eventuali interventi sono giustificati solo per contenere la popolazione che nella prossima generazione risulterà particolarmente dannosa; si consigliano prodotti a base di Clorpirifos, Clorpirifos Metile.

Tecnica colturale: date le alte temperature dei giorni scorsi si consiglia di effettuare un'irrigazione di soccorso purché in linea con gli obiettivi enologici fissati; in alternativa eseguire una lavorazione superficiale del terreno.

Previsioni del tempo

Previsioni per giovedì 14 luglio 2011

Cielo sereno con addensamenti sulla Sardegna occidentale nelle prime ore del giorno.

Temperature: in sensibile calo in entrambi i valori.

Venti: deboli o moderati da Ovest Nord-Ovest.

Previsioni per venerdì 15 luglio 2011

Cielo sereno.

Temperature: minime in diminuzione, massime senza variazioni di rilievo.

Venti: moderati da Ovest Nord-Ovest, in attenuazione nel corso della serata.

Tendenza per i giorni successivi

Per sabato e domenica cielo sereno salvo passaggi di nubi alte. Le temperature minime rimarranno stazionarie sabato e aumenteranno il giorno seguente, mentre le massime tenderanno ad aumentare progressivamente. I venti soffieranno deboli a regime di brezza

Notizie

Corsi Patentino Verde. I moduli di iscrizione possono essere ritirati presso gli uffici Laore di Muravera e Castiadas; si prevede l'organizzazione del prossimo corso a partire dalla prima settimana di settembre 2011. Le richieste dovranno essere spedite presso la sede della Provincia in Via G. Guglielmo 46 a Cagliari entro il mese di agosto 2011.

Notiziario fitosanitario per l'area del Sarrabus-Gerrei

N. 11/2011 - Valido per il periodo:
20 luglio - 28 luglio 2011

Consigli colturali



Agrumi Fase fenologica: ingrossamento frutti

Ragnetto rosso (*Tetranychus Urticae*). Se si supera la soglia del 10% di foglie con presenza di forme mobili, effettuare un trattamento con uno dei seguenti principi attivi: Exitiazox, Fenazaquin, Tebufenpirad.

Non si segnalano altre avversità da controllare.

Consigli colturali: effettuare una ripulitura/sfoltitura dalle parti secche per meglio arieggiare l'interno della chioma in modo da contenere lo sviluppo di parassiti e

migliorare l'efficacia dei trattamenti.

Irrigazione: eseguire uno o due turni irrigui/settimana somministrando almeno 350 mc/ha.



Vite Fase fenologica (Cannonau): chiusura grappolo.

Cicaline (Empoasca Vitis). In alcuni vigneti si segnala la sua presenza; al superamento della soglia di danno pari a due individui per foglia, si consiglia di intervenire con prodotti a base di Clorpirifos, Clorpirifos Metile o Tiametoxam.

Cocciniglie (Planococcus spp.). In alcuni areali si sono riscontrati attacchi localizzati in alcuni ceppi (bagnatura di melata vischiosa sulle foglie). Per evitare la diffusione dell'insetto si consiglia un trattamento localizzato con

Clorpirifos o Clorpirifos Metile, Tiametoxam, quest'ultimo è ammesso in regime di produzione integrata.

*Per chi aderisce alla Mis. 214 regime di produzione integrata: tiametoxam, max 1 intervento

all'anno, clorpirifos o clorpirifos-metile max 3 interventi all'anno, indipendentemente dall'avversità controllata.

Oidio (*Erysiphe necator*): Non è un periodo in cui la patologia crea particolari problemi; tuttavia nei vigneti in cui ci sono stati attacchi mal curati nelle fasi fenologiche di fioritura e allegagione, si consigliano trattamenti a base di zolfo bagnabile micronizzato per evitare problemi di ustioni, oppure trattamenti con prodotti endoterapici quali Spiroxamina, Penconazolo, Quinoxifen, Trifloxystrobin etc.

Tignoletta (*Lobesia Botrana*) dai controlli in campo non risultano necessari interventi.

Tecnica colturale: date le alte temperature dei giorni scorsi si consiglia di effettuare un'irrigazione di soccorso purché in linea con gli obiettivi enologici fissati; in alternativa eseguire una lavorazione superficiale del terreno.

Previsioni del tempo

Mercoledì 20 luglio 2011

Cielo poco nuvoloso.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime in sensibile diminuzione.

Venti: moderati da Nord-Ovest. Rinforzi sulle Bocche di Bonifacio.

Giovedì 21 luglio 2011

Cielo poco nuvoloso.

Temperature: minime senza variazioni di rilievo, massime in aumento.

Venti: deboli o moderati da Nord-Ovest. Rinforzi sulle Bocche di Bonifacio.

Tendenza per i giorni successivi

Per le giornate di venerdì e sabato si avrà cielo generalmente poco nuvoloso. Le temperature tenderanno ad aumentare. I venti soffieranno deboli con componente prevalente nord-occidentale, più intensi nel settentrione.

Notizie

Corsi Patentino Verde. I moduli di iscrizione possono essere ritirati presso gli uffici Laore di Muravera e Castiadas; si prevede l'organizzazione del prossimo corso a partire dalla prima settimana di settembre 2011. Le richieste dovranno essere spedite presso la sede della Provincia in Via G. Guglielmo 46 a Cagliari entro il mese di agosto 2011.

Notiziario fitosanitario per l'area del Sarrabus-Gerrei

N. 12/2011 - Valido per il periodo:
28 luglio - 04 agosto 2011

Consigli colturali



Vite

Fase fenologica (Cannonau): inizio invaiatura.

Cicaline (Empoasca Vitis): in alcuni vigneti si segnala la sua presenza; al superamento della soglia di danno pari a 1-2 individui per foglia, si consiglia di intervenire con prodotti a base di Clorpirifos, Clorpirifos Metile (efficaci anche contro tignoletta e cocciniglia) o Tiametoxam (efficace anche contro la cocciniglia.).

Cocciniglie (Planococcus spp.): in alcuni areali si sono riscontrati attacchi localizzati in alcuni ceppi (bagnatura di melata vischiosa su foglie e grappoli). Si consiglia un trattamento localizzato con, Clorpirifos, Clorpirifos Metile

o Tiametoxam, quest'ultimo è ammesso in regime di produzione integrata.

***Per chi aderisce alla Mis. 214 azione 6 regime di produzione integrata: tiametoxam, max 1 intervento all'anno, clorpirifos o clorpirifos-metile max 3 interventi all'anno, indipendentemente dall'avversità controllata.**

Oidio (*Erysiphe necator*): dato il periodo la patologia non crea particolari problemi; tuttavia nei vigneti in cui ci sono stati attacchi mal curati durante la fioritura e allegagione, si consigliano trattamenti a base di zolfo bagnabile micronizzato per evitare problemi di ustioni, o trattamenti con prodotti endoterapici quali Spiroxamina, Penconazolo, Quinoxifen, Trifloxystrobin etc.

Tignoletta (*Lobesia Botrana*): dai controlli in campo non risultano necessari interventi.

Mal dell'esca: non potendo attuare una lotta diretta con l'ausilio di presidi chimici specifici, diventa indispensabile agire in modo preventivo per contenere la diffusione delle infezioni e la mortalità delle piante. Pertanto si raccomanda di segnalare i ceppi colpiti per poterli potare separatamente durante il riposo vegetativo.

Consigli: effettuare una ripulitura/sfoltitura dalle parti secche per meglio arieggiare l'interno della chioma in modo da contenere lo sviluppo di parassiti e migliorare l'efficacia dei trattamenti. Date le alte temperature dei giorni scorsi si consiglia di effettuare un'irrigazione di soccorso entro la fase di invaiatura, purché in linea con gli obiettivi enologici fissati; in alternativa eseguire una lavorazione superficiale del terreno.



Agrumi

Fase fenologica:
ingrossamento frutti

Cocciniglia Rossa Forte

(*Aonidiella Aurantii*)

Dai dati rilevati nelle stazioni di monitoraggio e dal calcolo dei gradi-giorno (ARPAS Dip. Specialistico Regionale Idrometeo-Climatico), si è raggiunta la soglia d'intervento. Si consiglia di eseguire un trattamento con oli minerali leggeri eventualmente attivati con prodotti a base di Clorpirifos- Clorpirifos-metile. In alternativa, per chi non lo avesse già impiegato, Piriproxifen. (max un trattamento all'anno). Trattare entro la fine della prossima settimana.

Notizie

Corsi Patentino Verde: si prevede l'organizzazione a partire dalla prima settimana di settembre 2011. Le richieste dovranno essere spedite presso la sede della Prov. in Via G. Guglielmo 46 a Cagliari entro il mese di agosto 2011.

Notiziario fitosanitario per l'area del Sarrabus-Gerrei

N. 13/2011 - Valido per il periodo:
04 agosto - 11 agosto 2011

Consigli colturali



Vite

Fase fenologica (Cannonau): invaiatura

Cicaline (Empoasca Vitis, Jacobiasca lybica): in alcuni vigneti si segnala la loro presenza. Al superamento della soglia di danno, pari a 1- 2 individui per foglia degli apici, si consiglia di intervenire con prodotti a base di Clorpirifos, Clorpirifos Metile (efficaci anche contro tignoletta e cocciniglia) o Tiametoxam. (Quest'ultimo, efficace anche contro la cocciniglia, può essere impiegato massimo una volta all'anno).

Cocciniglie (Planococcus spp.): In alcuni areali si sono riscontrati attacchi localizzati in alcuni ceppi (bagnatura di melata vischiosa su foglie e grappoli). Si consiglia un trattamento

localizzato con , Clorpirifos, Clorpirifos Metile o Tiametoxam, quest'ultimo è ammesso in regime di produzione integrata con massimo un trattamento all'anno.

Per chi aderisce alla Mis. 214 azione 6, regime di produzione integrata: tiametoxam, max 1 intervento all'anno, clorpirifos o clorpirifos-metile max 3 interventi all'anno, indipendentemente dall'avversità controllata.

Oidio (Erysiphe necator): dato il periodo la patologia non crea particolari problemi; tuttavia nei vigneti in cui ci sono stati attacchi mal curati durante la fioritura e allegagione, si consigliano trattamenti a base di zolfo bagnabile micronizzato per evitare problemi di ustioni, o trattamenti con prodotti endoterapici quali Spiroxamina, Penconazolo, Quinoxifen ,Trifloxystrobin etc.

Tignoletta: (Lobesia Botrana) dai controlli in campo si osserva un incremento delle catture, tuttavia, non avendo raggiunto il "picco", non risultano necessari interventi.

Tecnica colturale: date le alte temperature, si consiglia di effettuare un'irrigazione di soccorso entro la fase di invaiatura, purché in linea con gli obiettivi enologici fissati; in alternativa eseguire una lavorazione superficiale del terreno.

Mal dell'esca: non potendo attuare una lotta diretta con l'ausilio di presidi chimici specifici, diventa indispensabile agire in modo preventivo per contenere la diffusione delle infezioni e la mortalità delle piante. Pertanto si raccomanda di segnalare i ceppi colpiti per poterli potare separatamente durante il riposo vegetativo.



Agrumi

Fase fenologica:
ingrossamento
frutti-attività
vegetativa

Cocciniglia Rossa Forte (Aonidiella Aurantii):
Si consiglia di terminare i trattamenti entro la fine della settimana.

Ragneto rosso (Tetranychus Urticae): si segnala la sua presenza. Al superamento della soglia di danno, pari al 10% di foglie occupate da forme mobili e 2% di frutti infestati, intervenire con prodotti a base di Exitiazox, Fenazaquin o Tebufenpirad.

Le aziende che aderiscono alla misura 214 azione 6 "Produzione Integrata" possono effettuare massimo un trattamento all'anno contro questa avversità.

Consigli colturali: effettuare una ripulitura/sfoltitura dalle parti secche per meglio arieggiare l'interno della chioma in modo da contenere lo sviluppo di parassiti e migliorare l'efficacia dei trattamenti.

Irrigazione. Eseguire almeno due turni irrigui alla settimana somministrando 300-350 mc./ha.

Notiziario fitosanitario per l'area del Sarrabus-Gerrei

N. 14/2011 - Valido per il periodo:
11 agosto - 18 agosto 2011

Consigli colturali

Agrumi Fase fenologica: ingrossamento frutti-attività vegetativa

Ragneto rosso (*Tetranychus Urticae*). Si segnala la sua presenza. Al superamento della soglia di danno, pari al 10% di foglie occupate da forme mobili e 2% di frutti infestati, intervenire con prodotti a base di Exitiazox, Fenazaquin o Tebufenpirad. Le aziende che aderiscono alla misura 214 azione 6 "Produzione Integrata" possono effettuare massimo un trattamento all'anno contro questa avversità.

Consigli colturali: effettuare una ripulitura/sfoltitura dalle parti secche per meglio arieggiare l'interno della chioma in modo da contenere lo sviluppo di parassiti e migliorare l'efficacia dei trattamenti.

Irrigazione. Eseguire almeno due turni irrigui alla settimana somministrando 300-350 mc./ha.

Vite Fase fenologica (Cannonau): invaiatura.

Tignoletta: (Lobesia Botrana) i controlli in campo con le trappole di monitoraggio, indicano il raggiungimento del "picco", per cui, nei vigneti più suscettibili, si suggerisce l'intervento con Clorpirifos o Clorpirifos Metile.

Cicaline (Empoasca vitis, Jacobiasca lybica). In alcuni vigneti si segnala la loro presenza. Al superamento della soglia di danno, pari a 1- 2 individui per foglia degli apici, si consiglia di intervenire con prodotti a base di Clorpirifos, Clorpirifos Metile (efficaci anche contro tignoletta e cocciniglia) o Tiametoxam. (Quest'ultimo, efficace anche contro la cocciniglia, può essere impiegato massimo una volta all'anno)

Cocciniglie (Planococcus spp.) In alcuni areali si sono riscontrati attacchi localizzati in alcuni ceppi (bagnatura di melata vischiosa su foglie e grappoli). Si consiglia un trattamento localizzato con, Clorpirifos, Clorpirifos Metile o Tiametoxam, quest'ultimo è ammesso in regime di produzione integrata con massimo un trattamento all'anno indipendentemente dall'avversità controllata.

*Per chi aderisce alla Mis. 214 azione 6, regime di produzione integrata: tiametoxam, max 1 intervento all'anno, clorpirifos o clorpirifos-metile max 3 interventi all'anno, indipendentemente dall'avversità controllata.

Oidio (Erysiphe necator): dato il periodo la patologia non crea particolari problemi; tuttavia nei vigneti in cui ci sono stati attacchi mal curati durante le fasi precedenti, in abbinamento agli altri trattamenti si consiglia l'uso di zolfo micronizzato.

Tecnica colturale: date le alte temperature, si consiglia di effettuare un'irrigazione di soccorso entro la fase di invaiatura, purché in linea con gli obiettivi enologici fissati; in alternativa eseguire una lavorazione superficiale del terreno.

Mal dell'esca: agire in modo preventivo per contenere la diffusione delle infezioni e la mortalità delle piante segnando i ceppi colpiti per poterli potare separatamente durante il riposo vegetativo.

Previsioni del tempo

Previsioni per giovedì 11 agosto 2011

Cielo sereno salvo addensamenti sulla Sardegna meridionale in serata.
Temperature: stazionarie o in lieve aumento.
Venti: deboli orientali in mattinata, a regime di brezza dalle ore centrali della giornata.

Previsioni per venerdì 12 agosto 2011

Cielo sereno o poco nuvoloso.
Temperature: stazionarie o in lieve aumento.
Venti: deboli a regime di brezza.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di sabato e domenica saranno caratterizzate da cielo sereno con passaggi di nubi alte. Le temperature tenderanno ad aumentare in entrambi i valori. I venti soffieranno deboli a regime di brezza.


Notizie

Corso per fattorie didattiche: Si informa che sono disponibili i moduli di richiesta presso gli uffici Laore di Muravera, Castiadas e Villasalto Corsi Patentino Verde. Si prevede l'organizzazione a partire dalla prima settimana di settembre 2011.

Notiziario fitosanitario per l'area del Sarrabus-Gerrei

N. 15/2011 - Valido per il periodo:
18 agosto - 25 agosto 2011

Consigli colturali



Agrumi Fase fenologica: ingrossamento frutti-attività vegetativa
Ragneto rosso (*Tetranychus Urticae*). Si segnala la sua presenza. Al superamento della soglia di danno, pari al 10% di foglie occupate da forme mobili e 2% di frutti infestati, intervenire con prodotti a base di Exitiazox, Fenazaquin o Tebufenpirad. Le aziende che aderiscono alla misura 214 azione 6 "Produzione Integrata" possono effettuare massimo un trattamento all'anno contro questa avversità. Consigli colturali: effettuare una ripulitura/sfoltitura dalle parti secche per meglio arieggiare l'interno della chioma in modo da contenere lo sviluppo di parassiti e migliorare l'efficacia dei trattamenti. Irrigazione. Eseguire almeno due turni irrigui alla settimana somministrando 300-350 mc./ha.



Vite Fase fenologica (Cannonau): fine invaiatura.

Tignoletta: (*Lobesia Botrana*) i controlli in campo con le trappole di monitoraggio, indicano il raggiungimento del "picco", per cui, nei vigneti più suscettibili, si suggerisce l'intervento con Clorpirifos o Clorpirifos Metile.

Cicaline (*Empoasca vitis*, *Jacobiasca lybica*). In alcuni vigneti si segnala la loro presenza. Al superamento della soglia di danno, pari a 1- 2 individui per foglia degli apici, si consiglia di intervenire con prodotti a base di Clorpirifos, Clorpirifos Metile (efficaci anche contro tignoletta e cocciniglia) o Tiametoxam. (Quest'ultimo, efficace anche contro la cocciniglia, può essere impiegato massimo una

volta all'anno)

Cocciniglie (*Planococcus spp.*) In alcuni areali si sono riscontrati attacchi localizzati in alcuni ceppi (bagnatura di melata vischiosa su foglie e grappoli). Si consiglia un trattamento localizzato con, Clorpirifos, Clorpirifos Metile o Tiametoxam, quest'ultimo è ammesso in regime di produzione integrata con massimo un trattamento all'anno indipendentemente dall'avversità controllata.

*Viticultura. Per chi aderisce alla Mis. 214 azione 6, regime di produzione integrata: tiametoxam, max 1 intervento all'anno, clorpirifos o clorpirifos-metile max 3 interventi all'anno, indipendentemente dall'avversità controllata.

Oidio (*Erysiphe necator*): dato il periodo la patologia non crea particolari problemi; tuttavia nei vigneti in cui ci sono stati attacchi mal curati durante le fasi precedenti, in abbinamento agli altri trattamenti si consiglia l'uso di zolfo micronizzato.

Tecnica colturale: date le alte temperature, si consiglia di effettuare un'irrigazione di soccorso entro la fase di invaiatura, purché in linea con gli obiettivi enologici fissati; in alternativa eseguire una lavorazione superficiale del terreno.

Mal dell'esca: agire in modo preventivo per contenere la diffusione delle infezioni e la mortalità delle piante segnando i ceppi colpiti per poterli potare separatamente durante il riposo vegetativo.

Previsioni del tempo

Previsioni per giovedì 18 agosto

Cielo sereno, foschie mattutine sulle coste orientali e meridionali.

Temperature: minime in lieve aumento al Nord stazionarie altrove, massime in aumento. Venti: deboli o localmente moderati in prevalenza da Sud-Est; brezze pomeridiane sulla Sardegna settentrionale.

Previsioni per venerdì 19 agosto

Cielo sereno, foschie mattutine sulle coste orientali e meridionali.

Temperature: minime stazionarie massime in lieve aumento. Venti: deboli o localmente moderati in prevalenza da Sud-Est; brezze pomeridiane sulla Sardegna settentrionale.

Tendenza per i giorni successivi

Per le giornate di sabato e domenica avremo cielo generalmente sereno. Le temperature aumenteranno in entrambi i valori. I venti soffieranno a regime di brezza.

Corso per fattorie didattiche: Si informa che sono disponibili i moduli di richiesta presso gli uffici Laore di Muravera, Castiadas e Villasalto

Corsi Patentino Verde. Si prevede l'organizzazione a partire dalla prima settimana di settembre 2011.

Notiziario fitosanitario per l'area del Sarrabus-Gerrei

N. 16/2011 - Valido per il periodo:
08 settembre - 15 settembre 2011

Consigli colturali



Agrumi

Fase fenologica: ingrossamento frutti

Ragneto rosso (Tetranychus Urticae): si segnala la sua presenza. Al superamento della soglia di danno, pari al 10% di foglie occupate da forme mobili e 2% di frutti infestati, intervenire con prodotti a base di Exitiazox, Fenazaquin o Tebufenpirad.

Le aziende che aderiscono alla misura 214 azione 6 "Produzione Integrata" possono effettuare massimo un trattamento all'anno contro questa avversità.

Consigli colturali: effettuare una ripulitura/sfoltitura dalle parti secche per meglio arieggiare l'interno della chioma in modo da contenere lo sviluppo di parassiti e migliorare l'efficacia dei trattamenti.

Concimazione: si consiglia l'uso del nitrato di potassio in dosi di 400 gr./pianta.

Irrigazione. Eseguire almeno due turni irrigui alla settimana somministrando 300-350 mc./ha.



Vite

Fase fenologica (Cannonau): maturazione (Gradi Babo 19-20)

Mal dell'esca: agire in modo preventivo per contenere la diffusione delle infezioni e la mortalità delle piante segnando i ceppi colpiti per poterli potare separatamente durante il riposo vegetativo.

Si informa che dal prossimo 15 settembre 2011 si potranno conferire le uve presso la Cantina di Castiadas. Per qualsiasi informazione rivolgersi presso la Cantina in località Oliaspeciosa o al n. telefonico 070-9949004

Previsioni del tempo

Previsioni per giovedì 8 settembre 2011

Cielo poco nuvoloso.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie.

Venti: deboli o moderati da Ovest Nord-Ovest con rinforzi sulle Bocche di Bonifacio.

Previsioni per venerdì 9 settembre 2011

Cielo poco nuvoloso.

Temperature: minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve aumento. Venti: deboli o moderati da Ovest Nord-Ovest. Attenuazione in serata.

Tendenza per i giorni successivi

Per il fine settimana si avrà cielo sereno o poco nuvoloso con probabile formazione di foschie mattutine. Le temperature subiranno un aumento. I venti soffieranno deboli a regime di brezza.

Notizie

Corso per fattorie didattiche: si informa che sono disponibili i moduli di richiesta presso gli uffici Laore di Muravera, Castiadas e Villasalto

Notiziario fitosanitario per l'area del Sarrabus-Gerrei

N. 17/2011 - Valido per il periodo:
14 settembre - 22 settembre 2011

Consigli colturali



Agrumi Fase fenologica: ingrossamento frutti

Ragneto rosso (*Tetranychus Urticae*). Si segnala la sua presenza. Al superamento della soglia di danno, pari al 10% di foglie occupate da forme mobili e 2% di frutti infestati, intervenire con prodotti a base di Exitiazox, Fenazaquin o Tebufenpirad.

Le aziende che aderiscono alla misura 214 azione 6 "Produzione Integrata" possono effettuare massimo un trattamento all'anno contro questa avversità.

Consigli agronomici: effettuare una ripulitura/sfoltitura dalle parti secche per meglio arieggiare l'interno della chioma in modo da contenere lo sviluppo di parassiti e

migliorare l'efficacia dei trattamenti.

Concimazione: si consiglia l'uso del nitrato di potassio in dosi di 400 gr./pianta.

Irrigazione. Eseguire almeno due turni irrigui alla settimana somministrando 300-350 mc./ha.



Vite

Fase fenologica (Cannonau): fine maturazione - (Gradi Babo 19-20)

Mal dell'esca: agire in modo preventivo per contenere la diffusione delle infezioni e la mortalità delle piante segnando i ceppi colpiti per poterli potare separatamente durante il riposo vegetativo.

Si informa che dal 15 settembre 2011 si potranno conferire le uve presso la Cantina di Castiadas. Per qualsiasi informazione rivolgersi presso la Cantina in località Oliaspeciosa o al n. telefonico 070-9949004.

Previsioni del tempo

Previsioni per giovedì 15 settembre 2011

Cielo poco nuvoloso salvo addensamenti sui rilievi dove non si escludono isolati rovesci pomeridiani. Temperature: minime stazionarie, massime in leggero aumento. Venti: deboli a regime di brezza.

Previsioni per venerdì 16 settembre 2011

Cielo poco nuvoloso per il transito di nubi alte. Temperature: minime in leggero aumento, massime stazionarie. Venti: deboli a regime di brezza.

Tendenza per i giorni successivi

Sabato cielo poco nuvoloso. Domenica progressivo aumento della copertura. Temperature stazionarie sabato in leggera diminuzione domenica. Venti deboli a regime di brezza in rinforzo da Ovest Nord-Ovest dalla nottata di sabato e per tutto il giorno seguente.

Notizie

Corso per fattorie didattiche: si informa che sono disponibili i moduli di richiesta presso gli uffici Laore di Muravera, Castiadas e Villasalto.

Notiziario fitosanitario per l'area del Sarrabus-Gerrei

N. 18/2011 - Valido per il periodo:
22 settembre - 29 settembre 2011

Consigli colturali



Agrumi

Fase fenologica: ingrossamento frutti

Ragneto rosso (Panonychus Citrii)

Si segnala la sua presenza. Al superamento della soglia di danno, pari al 30% di foglie infestate e/o 3 acari/foglia, intervenire con prodotti a base di Exitiazox, Fenazaquin o Tebufenpirad.

Le aziende che aderiscono alla misura 214 azione 6 "Produzione Integrata" possono effettuare massimo un trattamento all'anno contro questa avversità.

Cocciniglia Rossa Forte (Aonidiella Aurantii).

Dai controlli in campo ancora non si è raggiunta la soglia d'intervento.

Consigli colturali

Effettuare una ripulitura/sfoltitura dalle parti secche per meglio arieggiare l'interno della chioma in modo da contenere lo sviluppo di parassiti e migliorare l'efficacia dei trattamenti.

Concimazione

Si consiglia l'uso del nitrato di potassio in dosi di 400 gr./pianta.

Irrigazione

Eseguire almeno due turni irrigui alla settimana somministrando 300-350 mc./ha.

Previsioni del tempo

Previsioni per giovedì 22 sett. 2011

Cielo poco nuvoloso con passaggi di nubi alte in mattinata. Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime stazionarie.

Venti: deboli variabili con rinforzi da Nord-Ovest sul settore occidentale in serata.

Previsioni per venerdì 23 sett. 2011

Cielo poco nuvoloso

Temperature: stazionarie.

Venti: calma o deboli variabili.

Tendenza per i giorni successivi

Sabato si avrà cielo poco nuvoloso con graduale aumento della copertura nella serata. Domenica si prevede cielo nuvoloso con probabili piogge nel sud dell'isola.

Temperature minime in aumento domenica, le massime diminuiranno. I venti calmi o deboli variabili.

Notizie

Corsi Patentino Verde: si informa che il prossimo corso si terrà nel mese di novembre 2011; le domande dovranno essere spedite entro il mese di ottobre.

Per informazioni contattare gli uffici Laore di Muravera, Castiadas e Villasalto

Notiziario fitosanitario per l'area del Sarrabus-Gerrei

N. 19/2011 - Valido per il periodo:
29 settembre - 06 ottobre 2011

Consigli colturali



Agrumi Fase fenologica: ingrossamento frutti

Ragneto rosso (Panonychus Citrii). Si segnala la sua presenza. Al superamento della soglia di danno, pari al 30% di foglie infestate e/o 3 acari/foglia, intervenire con prodotti a base di Exitiazox, Fenazaquin o Tebufenpirad.

Le aziende che aderiscono alla misura 214 azione 6 "Produzione Integrata" possono effettuare massimo un trattamento all'anno contro questa avversità.

Cocciniglia Rossa Forte (Aonidiella Aurantii). Dai controlli in campo si è raggiunta la soglia d'intervento. E' possibile

intervenire con prodotti a base di Clorpirifos o Clorpirifos Metile con l'aggiunta di olio minerale all'1% massimo. Trattare nelle ore fresche della giornata e intervenire solo in caso di reale necessità ed eventualmente localizzando i trattamenti nelle aree o nelle piante infestate. Si consiglia di effettuare il trattamento entro la prima settimana di ottobre.

Si ricorda che le aziende che aderiscono alla misura 214 azione 6 "Produzione Integrata" che hanno già impiegato i suddetti principi attivi, possono effettuare il trattamento solo con olio minerale.

Consigli colturali: effettuare una ripulitura/sfoltitura dalle parti secche per meglio arieggiare l'interno della chioma in modo da contenere lo sviluppo di parassiti e migliorare l'efficacia dei trattamenti.

Concimazione: si consiglia l'uso del nitrato di potassio in dosi di 400 gr./pianta.

Irrigazione. Eseguire almeno due turni irrigui alla settimana somministrando 300-350 mc./ha.

Previsioni del tempo

Previsioni per giovedì 29 settembre 2011

Cielo poco nuvoloso con addensamenti sulla Sardegna meridionale associati a isolati rovesci pomeridiani.
Temperature: senza variazioni di rilievo.
Venti: deboli dai quadranti orientali.

Previsioni per venerdì 30 settembre 2011

Cielo sereno o poco nuvoloso.
Temperature: minime in leggero calo, massime stazionarie.
Venti: deboli dai quadranti orientali.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di sabato e domenica saranno caratterizzate da cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni. I venti soffieranno deboli in prevalenza dai quadranti orientali.

Notizie

Corsi Patentino Verde: Si informa che il prossimo corso si terrà nel mese di novembre 2011; le domande dovranno essere spedite entro il mese di ottobre. Per informazioni contattare gli uffici Laore di Muravera, Castiadas e Villasalto

Notiziario fitosanitario per l'area del Sarrabus-Gerrei

N. 20/2011 - Valido per il periodo:
05 ottobre - 13 ottobre 2011

Consigli colturali



Agrumi Fase fenologica: ingrossamento frutti –
pre-invaiaura

Cocciniglia Rossa Forte (Aonidiella Aurantii)
Completare i trattamenti entro il 10 ottobre con
prodotti a base di Clorpirifos o Clorpirifos Metile con
l'aggiunta di olio minerale all'1% massimo.

Trattare nelle ore fresche della giornata e intervenire
solo in caso di reale necessita ed eventualmente
localizzando i trattamenti nelle aree o nelle piante
infestate.

Si ricorda che le aziende che aderiscono alla misura 214 azione 6 "Produzione Integrata" che
hanno già impiegato i suddetti principi attivi, possono effettuare il trattamento solo con olio
minerale.

Consigli colturali: effettuare una ripulitura/sfoltitura dalle parti secche per meglio arieggiare
l'interno della chioma in modo da contenere lo sviluppo di parassiti e migliorare l'efficacia dei
trattamenti.

Irrigazione. Eseguire almeno due turni irrigui alla settimana somministrando 300-350 mc./ha.
Evitare di eccedere nell'irrigazione.

Previsioni del tempo

Giovedì 6 ottobre 2011

Cielo poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani sui
rilievi associati a possibili isolati rovesci. Possibili foschie
mattutine. Temperature: senza variazioni di rilievo. Venti:
deboli variabili tendenti ad orientarsi dai quadranti
occidentali in serata.

Venerdì 7 ottobre 2011

Cielo nuvoloso con possibili rovesci.
Temperature: minime in aumento, massime in sensibile
calo.
Venti: moderati o forti da Nord-Ovest.

Tendenza per i giorni successivi

Per la giornata di sabato si prevede cielo nuvoloso con
possibili rovesci. Attenuazione dei fenomeni il giorno
seguente.

Le temperature subiranno una sensibile diminuzione nei
valori minimi mentre le massime si manterranno
stazionarie. I venti soffieranno deboli o moderati da Nord
Nord-Ovest.

Notizie

Corsi Patentino Verde: Si informa che il prossimo corso si
terrà nel mese di novembre 2011; le domande dovranno
essere spedite entro il mese di ottobre. Per informazioni
contattare gli uffici Laore di Muravera, Castiadas e
Villasalto

Notiziario fitosanitario per l'area del Sarrabus-Gerrei

N. 21/2011 - Valido per il periodo:
12 ottobre - 20 ottobre 2011

Consigli colturali



Agrumi

Fase fenologica: ingrossamento frutti -pre-invaiaitura

Mosca della frutta (Ceratitis Capitata)

Intervenire al superamento della soglia di 20 adulti a trappola a settimana o alla presenza delle prime punture sui frutti, con prodotti a base di SPINOSAD.

Spaccatura dei frutti (splitting).

Si è rilevata una accentuata presenza di frutti spaccati in modo particolare su varietà di Neveline e Washington, in minor misura su Clementino. Il fenomeno è imputabile in parte all'andamento stagionale particolarmente favorevole. Trattandosi di una fisiopatia legata a squilibri idrici e non ad una vera e propria malattia, non sono necessari trattamenti chimici.

Previsioni del tempo

Previsioni per giovedì 13 ottobre 2011

Cielo poco nuvoloso con probabile formazione di foschie mattutine. Temperature: stazionarie o in leggero calo. Venti: deboli occidentali in rinforzo e rotazione da Nord-Est.

Previsioni per venerdì 14 ottobre 2011

Cielo nuvoloso con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale sulla Sardegna orientale, nuvolosità irregolare sul resto dell'isola.

Temperature: minime stazionarie, massime in sensibile calo. Venti: deboli o moderati da Nord-Est con rinforzi sulle Bocche di Bonifacio.

Tendenza per i giorni successivi

Per la giornata di sabato si prevede cielo irregolarmente nuvoloso. Probabile aumento della copertura il giorno seguente. Le temperature subiranno una sensibile diminuzione. I venti soffieranno moderati da Nord-Est con locali rinforzi. Attenuazione nel corso della giornata di domenica.

Notizie

Controlli funzionali macchine irroratrici. Si avvisa tutti gli imprenditori che hanno aderito alle misure del PSR che sono obbligati ad effettuare i controlli funzionali delle irroratrici, pertanto entro il 20 ottobre 2011 dovranno inoltrare domanda di richiesta presso il Sut di Muravera. Per maggiori informazioni contattare gli uffici Laore di Muravera, Castiadas e Villasalto.