



DISERBO FRUMENTO DURO E ORZO

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S. a.</i>	<i>L. o Kg/ha</i>	<i>Note</i>
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1)	30,70	1,5 - 3	(1) Trattamenti al terreno in assenza di coltura, per preparazione di letti di semina o di trapianto Utilizzare in presenza di infestanti emerse
Pre emergenza	Dicotiledoni				
Pre semina Pre emergenza	Graminacee	Tri – allate (1) Diflufenican		3,6	(1) Al massimo 1 intervento per ciclo colturale
Post emergenza precoce	Graminacee e Dicotiledoni	Diflufenican	42,0	0,3	
Post emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Metribuzin (1)	35	0,2	(1) Solo in miscela con altri diserbanti di post emergenza, in terreni particolarmente infestati da papavero e cardo
		(Clodinafop-propargil+ Cloquintocet-Mexyl + Diflufenican) (1)	(5,5 + 1 + 3,77)	0,75	(1) Non ammesso su orzo
		(Propoxycarbazone-sodium + Iodosulfuron-methyl-sodium + Mefenpyr Diethyl) (1)	(16,8 + 1,00 + 8,00)	0,33	(1) Non ammesso su orzo
	Graminacee	(Fenoxaprop-p-etile + Cloquintocet-Mexyl)	(6,7 + 3,35)	0,8 -1	
		Tralkoxidim (Pinoxaden + Cloquintocet-Mexyl)	34,67 (5,05 + 1,26)	1,0 0,8 - 1	
		(Clodinafop-propargil + Cloquintocet-Mexyl) (1)	(22,3 + 5,60)	0,25	(1) Non ammesso su orzo
		(Clodinafop-propargil + Cloquintocet-Mexyl + Pinoxaden) (1)	(2,53 + 0,63 + 2,53)	1,0	(1) Non ammesso su orzo



Epoca d'impiego	Infestanti controllate	Sostanza attiva	% di S. a.	L. o Kg/ha	Note
Post emergenza	Dicotiledoni	Metsulfuron metile Tribenuron-metile Triasulfuron Tritosulfuron (1) (Tritosulfuron + Dicamba) (1) Metil oleato + Metil palmitato (2) Clopiralid Dicamba (Tifensulfuron – metile + Tribenuron-metile)	20,0 50,0 20,0 71,4 (25,0 + 50,0) 37,5 9,5 21,2 25 + 25	0,015 - 0,020 0,020 - 0,030 0,037 0,05 - 0,07 0,12 - 0,20 0,50 0,8 0,4 - 0,5 0,4 - 0,5	(1) Da utilizzare con il coadiuvante specifico (2) Coadiuvante per i prodotti a base di Tritosulfuron
	Dicotiledoni con Galium e Graminacee	(Iodosulfuron+Fenoxaprop-p-etile+ Mefenpir-dietile) (1)	(0,79+6,32 + 2,37)	1,25	(1) Non ammesso su orzo
		(Iodosulfuron-metil sodium + Mesosulfuron + Mefenpir-dietile) (1)	(0,60 + 3 + 9)	0,50	(1) Non ammesso su orzo
		(Pyroxulam + Florasulam + Cloquitocet mexyl) (1)	(7,08 + 1,42 + 7,08)	0,265	(1) Non ammesso su orzo
		(Pinoxaden + Clodinafop-propargil + Florasulam + Cloquintocet-Mexyl) (1)	(3,03 + 3,03 + 0,76 + 0,76)	0,67 - 1	(1) Non ammesso su orzo
		(Propoxycarbazone-sodium + Iodosulfuron-methyl-sodium + Amidosulfuron + Mefenpyr Diethyl) (1)	(14 + 0,83 + 6,00 + 6,70)	0,3 - 0,4	(1) Non ammesso su orzo
		(Iodosulfuron-methyl-sodium + Propoxycarbazone-sodium + Mefenpyr Diethyl) (1)	(1 + 16,8 + 8)	0,333	(1) Non ammesso su orzo
	Dicotiledoni Con Galium	Florasulam (Clopiralid + MCPA + Fluroxipyr) Fluroxipyr Dicamba (Clopiralid + Florasulam + Fluroxipyr) (Aminopirialid + Florasulam) (1) Clorsulfuron	4,84 (1,8 + 18,2 + 3,6) 20,6 21,2 (7,69 + 0,24 + 13,85) 35,5 + 15 75	0,1 - 0,125 4 0,7 - 0,9 0,4 - 0,5 1,5 0,33 0,2	(1) Non ammesso su orzo

Si consiglia di utilizzare le solfoniluree secondo le dosi indicate senza adottare sottodosaggi anche per applicazioni in miscela con altri prodotti