



## DISERBO ERBA MEDICA

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
<b>Pre semina</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate	30,7	1,5 - 3	Trattamenti al terreno in assenza di coltura, per preparazione di letti di semina o di trapianto
	Graminacee e Dicotiledoni	Benfluralin	19,2	6,5	
<b>Post emergenza</b>	Cuscuta	Propizamide (1)	35,0	4	(1) Impiegabile solo per il contenimento della Cuscuta con interventi localizzati che, annualmente e complessivamente, non potranno superare il 15% dell'intera superficie
	Graminacee e Dicotiledoni	Pyridate Metribuzin (1)	45,0 35	1,3 - 2 1	Al massimo 2 kg di prodotto all'anno (1) Interventi da effettuare dopo l'ultimo sfalcio con la coltura in riposo vegetativo
	Dicotiledoni	Imazamox	3,7	0,5 - 0,75	
	Graminacee	Quizalofop-P-etile isomero D (1) Quizalofop-p-etile (1)	4,9 5	1 - 1,5 1 - 1,5	(1) Non ammesso il primo anno di impianto. Ammesso al massimo 1 intervento all'anno