



DISERBO FAGIOLINO

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate	30,4	1.5 - 3	Utilizzare in presenza di infestanti emerse
Pre emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Clomazone Pendimetalin (1) Benfluralin (2)	30,74 38,72 60	0,2 - 0,3 1,75 1,5	Meglio su terreno umido Distribuire su seme ben coperto (1) Da impiegare in alternativa a Benfluralin (2) Da impiegare in alternativa a Pendimetalin
Post emergenza	Graminacee	Quizalofop-etile isomero D Quizalofop-p-etile Ciclossidim	4,93 5 10,8	1 - 1,5 1 - 1,5 1,5 - 2,5	
	Dicotiledoni	Bentazone	87	0,75	Coltura a 2 – 3 foglie vere
	Graminacee e Dicotiledoni	Imazamox (1) Bentazone + Imazamox	3,7 43,1 + 2	0,5 - 0,75 1,25	(1) Intervenire con la coltura a 2 - 4 foglie vere

E' vietato il diserbo chimico in coltura protetta