



## DISERBO CICORINO IN COLTURA PROTETTA (IV GAMMA)

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
<b>Pre-semina</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1)	30,4	1,5 - 3	Utilizzare in presenza di infestanti emerse <b>(1) Solo preparazione di letti di semina o di trapianto</b>
<b>Pre-semina</b>		Propizamide Benfluralin	36 19,2	3 - 4 6,50	
<b>Pre-Trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate	30,4	1,5 - 3	Preparare definitivamente il terreno circa un mese prima dell'impianto (falsa semina) ed intervenire a pochi giorni dalla stessa. Utilizzare in presenza di infestanti emerse
		Pendimetalin	38,72	2,5	<b>Non utilizzare in terreni sciolti</b>
<b>Pre emergenza e Pre trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Clorprofam	40,8	2	
<b>Pre e post trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Propizamide (1)	36	1,75 - 3,75	<b>Attenzione alle colture in sucessione</b> <b>(1) Per interventi in post-emergenza delle infestanti, utilizzare solo in autunno inverno con terreno umido</b>
<b>Post emergenza e Post trapianto</b>	Graminacee	Ciclossidim Propaquizafop	10,9 9,7	2 - 2,5 1 - 1,2	Le dosi variano in funzione delle infestanti da controllare